



รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว  
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช  
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๖๒๖  
E-mail: doae.pmd2566@gmail.com



## สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญ

### ศัตรูข้าว

#### ๑. สถานการณ์การปลูกข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด ๗๖ จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น ๕๔,๗๙๕,๑๑๔.๐๕ ไร่

#### ๒. สถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวที่สำคัญ

๒.๑ หนอนกอข้าว พื้นที่ระบาด ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม สงขลา และจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน ๑๖.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๑๑.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๕.๒๕ ไร่)

- |                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| ๑) ข้าวอายุ ๔๐ - ๖๐ วัน   | จำนวน | ๑.๒๕ ไร่  |
| ๒) ข้าวอายุมากกว่า ๖๐ วัน | จำนวน | ๑๕.๐๐ ไร่ |

๒.๒ เพลี้ยไฟ พบการระบาดในข้าวอายุ ๔๐ - ๖๐ วัน พื้นที่ระบาดจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน ๑๐.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๐.๐๐ ไร่)

๒.๓ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พื้นที่ระบาด ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สงขลา สกลนคร หนองบัวลำภู และจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน ๑๓๘.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๗.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๓๑.๐๐ ไร่)

- |                           |       |            |
|---------------------------|-------|------------|
| ๑) ข้าวอายุ ๔๐ - ๖๐ วัน   | จำนวน | ๑๑๕.๐๐ ไร่ |
| ๒) ข้าวอายุมากกว่า ๖๐ วัน | จำนวน | ๒๓.๐๐ ไร่  |

๒.๔ เพลี้ยกระโดดหลังขาว พื้นที่ระบาด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสกลนคร รวมจำนวน ๑๗๔.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๘.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๖๖.๕๐ ไร่)

- |                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| ๑) ข้าวอายุน้อยกว่า ๔๐ วัน | จำนวน | ๗๘.๐๐ ไร่ |
| ๒) ข้าวอายุ ๔๐ - ๖๐ วัน    | จำนวน | ๖๕.๕๐ ไร่ |
| ๓) ข้าวอายุมากกว่า ๖๐ วัน  | จำนวน | ๓๑.๐๐ ไร่ |

๒.๕ แมลงดำหนาม ไม่พบการระบาด พื้นที่ระบาดลดลง ๗๐.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๗๐.๐๐ ไร่)

๒.๖ โรคไหม้ข้าว พื้นที่ระบาด ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ พะเยา ขอนแก่น น่าน ตากบุรีรัมย์ สกลนคร นครราชสีมา จันทบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี และจังหวัดมุกดาหาร รวมจำนวน ๓,๘๘๘.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๗๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดลดลง ๑,๗๘๐.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๕,๖๖๘.๕๐ ไร่)

- |                            |       |              |
|----------------------------|-------|--------------|
| ๑) ข้าวอายุน้อยกว่า ๔๐ วัน | จำนวน | ๕๒.๐๐ ไร่    |
| ๒) ข้าวอายุ ๔๐ - ๖๐ วัน    | จำนวน | ๕๐๓.๐๐ ไร่   |
| ๓) ข้าวอายุมากกว่า ๖๐ วัน  | จำนวน | ๓,๓๓๓.๕๐ ไร่ |

๒.๗ โรคใบจุดสีน้ำตาล พื้นที่ระบาด ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สกลนคร และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมจำนวน ๓๗.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๙.๒๕ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๒๘.๐๐ ไร่)

- |                           |       |           |
|---------------------------|-------|-----------|
| ๑) ข้าวอายุ ๔๐ - ๖๐ วัน   | จำนวน | ๕.๒๕ ไร่  |
| ๒) ข้าวอายุมากกว่า ๖๐ วัน | จำนวน | ๓๒.๐๐ ไร่ |

### ๓. การดำเนินงานในพื้นที่ระบาด

#### ๓.๑ การควบคุมหนอกอข้าว

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่พบการระบาด ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของหนอกอข้าว พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโดยการไถน้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง หรือปลูกพืชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอกอข้าวปลูกพืชหมุนเวียน หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว

#### ๓.๒ การควบคุมเพลี้ยไฟ

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่พบการระบาด ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของเพลี้ยไฟ พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัด โดยการดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน ๗ วันอย่าให้ขาดน้ำ หรือไถน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ ๑ - ๒ วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย ๑ - ๓ ตัวต่อต้นในข้าวอายุ ๖ - ๗ วันหลังหว่าน หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว

#### ๓.๓ การควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมมือกับศูนย์วิจัยข้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาด แนะนำเกษตรกรหมั่นสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลง พร้อมให้คำแนะนำการใช้และวิธีการผลิตขยายเชื้อราบีวเวอร์เรีย เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี ๑ สุพรรณบุรี ๒ สุพรรณบุรี ๙๐ สุพรรณบุรี ๖๐ ปทุมธานี ๑ เป็นต้น และควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีเปียกหรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน ๗ - ๑๐ วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว

#### ๓.๔ การควบคุมเพลี้ยกระโดดหลังขาว

สำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว แนะนำเกษตรกรในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกข้าวเพื่อเป็นการลดที่อยู่อาศัยของเพลี้ยกระโดดหลังขาว หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว

#### ๓.๕ การควบคุมโรคไหม้ข้าว

๓.๕.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่พบการระบาด ลงพื้นที่สำรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าว พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าวแก่เกษตรกรด้วยวิธีผสมผสานพร้อมทั้งแนะนำวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาแก่เกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชในพื้นที่และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้หมั่นสำรวจติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่แปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้รีบทำการป้องกันกำจัดโดยทันที

๓.๕.๒ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สนับสนุนหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการที่จะผลิตและขยายเพื่อใช้ในพื้นที่ที่พบการระบาด ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

#### ๓.๖ การควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาล

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่พบการระบาด ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโดยการกำจัดวัชพืชในนา ทำแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ย ในอัตราที่เหมาะสม ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟางหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด หรือปลูก พืชหมุนเวียนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว

๔. คำแนะนำและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด

ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
<p>1. หนอนกอข้าว</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ใช้น้ำท่วมและไถดินเพื่อทำลายหนอนและดักแด้ของหนอนกอข้าวที่อยู่ตามตอซัง</li> <li>2. ปลุกพีชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนกอข้าว ปลุกพีชหมุนเวียน</li> <li>3. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้ใบข้าวงามหนอนกอชอบวางไข่</li> <li>4. ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและทำลาย เมื่อมีการระบาดรุนแรง</li> <li>5. ไม่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดในนาข้าว เพื่อช่วยให้ศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอนของหนอนกอข้าว สามารถควบคุมประชากรหนอนกอข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>6. เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวในระยะข้าวอายุ 3 - 4 สัปดาห์หลังหว่าน/ปักดำในระดับ 10 - 15 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้สารชนิดพ่นน้ำ เช่น คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว</li> </ol>
<p>2. เพลี้ยไฟ (rice thrips) ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>2. กำจัดวัชพืชในนาข้าว คันทนาและรอบๆแปลง</li> <li>3. ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ</li> <li>4. ใช้น้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าวอายุ 6-7 วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว</li> <li>5. ใช้สารฆ่าแมลง มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบใบข้าวมีหนอนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในระยะข้าวอายุ 10-15 วันหลังหว่าน</li> </ol>
<p>3. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i>Nilaparvata lugens</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการระบาด เช่น มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสุนัขป่า เป็นต้น</li> <li>2. ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นข้าวอวบเหมาะแก่การเข้าทำลาย</li> <li>3. ควบคุมระดับน้ำในนาข้าว โดยการระบายน้ำออกเป็นครั้งคราวแบบเปียกสลับแห้ง</li> <li>4. เมื่อตรวจพบสัดส่วนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ ระหว่าง 6 :1- 8 :1 หรือตัวอ่อนวัยที่ 1-2 เมื่อข้าวอายุ 30-45 วัน จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารกำจัดแมลง <ul style="list-style-type: none"> <li>- บuprofezin (Buprofezin) 10% WP อัตรา 25 กรัม</li> <li>- etofenprox (Etofenprox) 10% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</li> <li>- buprofezin/isoprocarb (Buprofezin /Isoprocarb) 5%/20% WP อัตรา 50 กรัม</li> </ul> </li> <li>5. เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัย จำนวนมากกว่า 1 ตัวต่อ 1 ต้น และไม่พบหรือพบมวนเขียวดูดไข่น้อยมาก ให้ใช้สาร <ul style="list-style-type: none"> <li>- etofenprox (Etofenprox) 10% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</li> <li>- carbosulfan (Carbosulfan) 20% EC อัตรา 110 มิลลิลิตร</li> <li>- isoprocarb (Isoprocarb) 50% WP อัตรา 60 กรัม</li> <li>- fenobucarb (Fenobucarb) 50% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร</li> </ul> </li> </ol>

ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	<p>โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่น ทุก 7 วัน และให้สลักกลุ่มสาร</p> <p>6. ในระยะข้าว ตั้งท้องถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 10 ตัวต่อกอ หรือ 1 ตัวต่อ 1 ต้น และพบมวนเขี้ยวคุดไข่จำนวนมากให้ใช้สาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไทอะมีโทแฆม (Thiamethoxam) 25% WP อัตรา 2 กรัม</li> <li>- ไดโนทีฟูเรน (Dinotefuran) 10% WP อัตรา 15 กรัม</li> <li>- โคลไทอะนิดิน (Clothianidin) 16% SG อัตรา 6-9 กรัม</li> <li>- อีทิโพรล (Ethiprole) 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตร</li> <li>- คาร์โบซัลแฟน (Carbosulfan) 20% EC อัตรา 110 มิลลิลิตร</li> </ul> <p>โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร และให้สลักกลุ่มสาร</p>
<p>4. เพลี้ยกระโดดหลังขาว</p> <p>ชื่อวิทยาศาสตร์ :</p> <p><i>Sogatella furcifera</i></p> <p>Horvath</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข31 และชุมแพ 60 โดยปลูกสลักกันอย่างน้อย 2 พันธุ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานได้ เร็ว หรือถ้าปลูกข้าวพันธุ์เดียว ไม่ควรปลูกติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก</li> <li>2. เมื่อตรวจพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้เข้าน้ำออกจากแปลงนา และปฏิบัติเช่นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล</li> </ol>
<p>5. โรคไหม้ข้าว</p> <p>เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา</p> <p><i>Pyricularia oryzae</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>2. ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวแนะนำให้ใช้ชีวภัณฑ์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- พันเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลีส) อัตราตามคำแนะนำในฉลาก</li> <li>- พันเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร</li> </ul> </li> <li>3. ถ้ามีความจำเป็นใช้สารเคมี แนะนำให้พ่นเฉพาะบริเวณที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป สารเคมีที่แนะนำมี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- อิติเฟนฟอส (Edifenphos) 50% EC อัตรา 20 - 25 มิลลิลิตร</li> <li>- บลาสติซิดิน - เอส (Blasticidin-s) 2% EC อัตรา 20- 25 มิลลิลิตร</li> <li>- ไตรไซคราโซล (Tricyclazole) 75% WP อัตรา 10- 16 กรัม</li> </ul> </li> </ol> <p>โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร และให้สลักกลุ่มสารเพื่อป้องกันเชื้อราสร้างความต้านทาน</p>
<p>6. โรคใบจุดสีน้ำตาล</p> <p>เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา</p> <p><i>Helminthosporium oryzae</i> Breda de Haan.</p> <p>(<i>Bipolaris oryzae</i> (Brada de Haan) Shoemaker)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปรับปรุงดินโดยการไถกลบฟาง หรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด หรือปลูก พืชหมุนเวียนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรค</li> <li>2) คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อ รา เช่น แมนโคเซ็บ หรือ คาร์เบนดาซิม+แมนโคเซ็บ อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม</li> <li>3) ใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยให้ข้าวเป็นโรคน้อยลง</li> <li>4) กำจัดวัชพืชในนา ทำแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ย ในอัตราที่เหมาะสม</li> <li>5) ถ้าพบอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาลรุนแรงทั่วไป 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ในระยะข้าวแตกกอหรือในระยะที่ต้นข้าวตั้งท้องใกล้ออกรวง เมื่อพบ อาการใบจุดสีน้ำตาลที่ใบธงในสภาพฝนตกต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดโรคเมล็ดต่าง ควรพ่นด้วย สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>- อิติเฟนฟอส (Edifenphos) 50% EC</li> </ul> </li> </ol>

ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	- คาร์เบนดาซิม (carbendazim) 50% SC - แมนโคเซ็บ (mancozeb) 80% WP - คาร์เบนดาซิม(carbendazim) + แมนโคเซ็บ (mancozeb) โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นตามอัตราคำแนะนำของฉลาก

**๕. การคาดการณ์ศัตรูพืช ในช่วงระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖**

**ภาคกลาง และภาคตะวันออก** ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอข้าว แมลงดำหนามข้าว โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้ข้าว






**ภาคเหนือ** ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว แมลงสีง โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ข้าว

**ภาคใต้** ระวัง แมลงสีง หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว และโรคไหม้ข้าว

**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ระวัง หนอนกอข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หอยเชอรี่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้ข้าว

**ภาคตะวันตก** ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนห่อใบข้าว หอยเชอรี่ และโรคไหม้ข้าว

# แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดของศัตรูข้าว ระหว่างปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖



หนอนกอข้าว	๑๖.๒๕ ไร่
เพลี้ยไฟ	๑๐.๐๐ ไร่
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	๑๓๘.๐๐ ไร่
เพลี้ยกระโดดหลังขาว	๑๗๔.๕๐ ไร่
โรคไหม้ข้าว	๓,๘๘๘.๕๐ ไร่
โรครูปจุดสีน้ำตาล	๓๗.๒๕ ไร่

ปี ๒๕๖๖