



# ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชประจำสัปดาห์

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ปีที่ 10 ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

## ตึกแตนปาทั้งกำ

เดือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง กล้าย มะพร้าว ถั่วเหลือง พืชตระกูลปาล์ม และพืชตระกูลหญ้า เผ่าระวังการระบาดของตึกแตนปาทั้งกำ เนื่องจากสถานการณ์การเลี้ยงตึกแตนปาทั้งกำเพื่อการค้ำกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในหลายพื้นที่ แต่ด้วยประเทศไทยเคยประสบปัญหาการระบาดของตึกแตนปาทั้งกำซึ่งสร้างความเสียหายกับพืชเศรษฐกิจสำคัญในหลายจังหวัด แม้ว่าปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของตึกแตนปาทั้งกำ แต่หากไม่ควบคุมการเลี้ยง และให้คำแนะนำการเลี้ยงที่ถูกต้อง อาจทำให้ตึกแตนปาทั้งกำหลุดออกมาทำลายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งผลให้เกิดการระบาดได้ ดังนั้นขอให้เกษตรกรหมั่นแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน



### ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกัดกินใบพืช หากถูกกัดกินจนได้รับความเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลผลิตสามารถทำลายพืชเศรษฐกิจสำคัญมากกว่า 34 ชนิด เช่น พืชตระกูลหญ้า ข้าว ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง กล้าย มะพร้าว ถั่วเหลือง พืชตระกูลปาล์ม เป็นต้น ซึ่งสามารถทำลายพืชอาหารได้ทั้งกลางวันและกลางคืน หากมีการระบาดจะเกิดความเสียหายรุนแรง รวดเร็ว เป็นบริเวณกว้าง ถ้าไม่เร่งกำจัดจะพบตึกแตนระบาดเพิ่มขึ้น 100 เท่า ในปีถัดไป



## แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

1. หมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ
2. ไถพรวนและตากดินหลายๆ ครั้ง เพื่อกำจัดไข่ต๊กแตน
3. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
4. ใช้ตาข่ายหรือสวิงจับตัวเต็มวัย เพื่อนำไปประกอบอาหาร
5. ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เมตตาไรเซียม หรือบิวเวอเรีย เป็นต้น โรยบนดินหลังปลูกพืช เพื่อกำจัดไข่และตัวอ่อนต๊กแตน
6. ใช้กับดักเหยื่อพิษ โดยผสมเหยื่อพิษ ดังนี้
  - 6.1 ใช้สารคาร์บาริล 85% WP 125 กรัม หรือ 210 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 2 ลิตร แกลบ 60 ลิตร ชั่งข้าวโพด 30 ลิตรหรือใช้มันสำปะหลังสดสับเป็นชิ้นขนาด 1 - 5 ลูกบาศก์ เซนติเมตร 50 ลิตร
  - 6.2 ใช้น้ำ 1 ลิตร : เกลือแกง 30 กรัม : แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (เบกกิ้งโซดา) 30 กรัม : สารกำจัดแมลงคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 50% SP 30 กรัม
 นำกระดาษ A4 ตัดเป็น 4 ส่วน แช่สารละลายเหยื่อพิษนาน 10 วินาทีผึ่งพอสухแล้วนำไปเสียบตามซอกต้นพืชสูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร วางกับดัก 150 - 200 จุดต่อไร่ ห่างกันประมาณ 3 เมตร แบบสลับฟันปลา วางกับดักซ้ำทุก 3 วัน จนกว่าตัวเต็มวัยจะลดลง

ที่มา : กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว

ที่มาภาพ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4

ที่ปรึกษา : นางสาวสุนนา ลิมาสฤษฎ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

บรรณาธิการ : นางสาวกันยกร อุทัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

เรียบเรียงโดย : นางสาวดวงฤทัย กิ่งคร นักวิชาการเกษตร

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย