



รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๕๕ ๑๖๗๖

E-mail : doae.pmd2566@gmail.com



สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้นที่สำคัญ

ศัตรูไม้ยืนต้น

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น

๑.๑ พื้นที่ปลูกมะพร้าว	ทั้งหมด ๖๒ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๑,๐๑๑,๐๑๕.๔๘ ไร่
๑.๒ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน	ทั้งหมด ๖๗ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๔,๔๐๙,๔๔๗.๐๔ ไร่
๑.๓ พื้นที่ปลูกยางพารา	ทั้งหมด ๖๖ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๑๗,๔๙๐,๑๔๔.๗๙ ไร่
๑.๔ พื้นที่ปลูกกาแฟ	ทั้งหมด ๖๐ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๙๔,๓๗๐.๔๑ ไร่

๒. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่สำคัญ

๒.๑ ศัตรูมะพร้าว

๒.๑.๑ หนองหัวดำ พื้นที่ระบบ ๒๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ราชบุรี สงขลา ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา สตูล สมุทรปราการ กระปี พังงา จันทบุรี ชัยภูมิ ภูเก็ต ปัตตานี สุรินทร์ กาญจนบุรี นครปฐม ยะลา บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน ๑๖,๐๓๗.๙๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบบเพิ่มขึ้น ๑๑.๓๐ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๑๖,๐๒๘.๖๙ ไร่) แบ่งเป็น

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (๑) การทำลายระดับน้อย | จำนวน ๗,๐๐๒.๙๔ ไร่ (๔๓.๖๖ %) |
| (๒) การทำลายระดับปานกลาง | จำนวน ๗,๔๐๒.๑๐ ไร่ (๔๙.๒๖ %) |
| (๓) การทำลายระดับรุนแรง | จำนวน ๑,๓๓๔.๐๕ ไร่ (๗.๑๘ %) |

๒.๑.๒ แมลงดำหาน้ำ พื้นที่ระบบ ๒๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตราด สตูล เพชรบุรี สงขลา พังงา ภูเก็ต กระปี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ตรัง จันทบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ยะลา ชัยภูมิ ระยอง ปัตตานี ยะลา บุรีรัมย์ รวมจำนวน ๑๔,๙๕๓.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๙ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบบเพิ่มขึ้น ๔๑๒.๙๙ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๑๔,๕๔๐.๗๘ ไร่) แบ่งเป็น

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (๑) การทำลายระดับน้อย | จำนวน ๖,๔๐๒.๔๖ ไร่ (๔๓.๔๘ %) |
| (๒) การทำลายระดับปานกลาง | จำนวน ๗,๒๑๐.๐๕ ไร่ (๔๙.๒๒ %) |
| (๓) การทำลายระดับรุนแรง | จำนวน ๑,๒๔๑.๒๕ ไร่ (๗.๓๐ %) |

๒.๑.๓ ตัวงแตร พื้นที่ระบบ ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ชลบุรี กระปี สมุทรปราการ นครปฐม สงขลา จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ปัตตานี ราชบุรี พังงา ระยอง และจังหวัดพัทลุง รวมจำนวน ๕,๗๖๐.๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบบเพิ่มขึ้น ๙.๔๐ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๕,๗๕๑.๒๙ ไร่)

๒.๑.๔ ตัวงวง พื้นที่ระบบ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี สมุทรปราการ พังงา และจังหวัดกระปี รวมจำนวน ๑,๔๔๐.๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบบลดลง ๐.๒๐ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๑,๔๔๐.๕๕ ไร่)

๒.๑.๕ ไรสีขามะพร้าว พื้นที่รับาด ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี จันทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชุมพร ยะแแก้ว บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร ตราด ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง และจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวน ๔๙๔.๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดลดลง ๒.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔๙๖.๔๒ ไร่)

๒.๑.๖ หนองกิน biome พื้นที่รับาด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมจำนวน ๑๕.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดลดลง ๔.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๙.๐๐ ไร่)

๒.๒ ศัตtruป่ามันน้ำมัน

๒.๒.๑ หนองปลอกเล็ก พื้นที่รับาด ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา กระปี้ ยะยอง และจังหวัดพังงา รวมจำนวน ๒,๔๓๖.๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดลดลง ๒๐.๑๕ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๒,๔๕๖.๖๘ ไร่)

๒.๒.๒ ตัวงแรด พื้นที่รับาด ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สตูล กระปี้ ตรัง ยะยอง ฉะเชิงเทรา ตราด จันทบุรี พังงา และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๑,๗๐๔.๖๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดลดลง ๔.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๗๐๘.๖๐ ไร่)

๒.๒.๓ ตัวงกุหลาบ พื้นที่รับาด ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร กระปี้ สตูล นราธิวาส จันทบุรี และจังหวัดพังงา รวมจำนวน ๗๐๔.๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดลดลง ๑.๕๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๗๐๖.๓๐ ไร่)

๒.๒.๔ หนองหน้าแมว พื้นที่รับาด ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล และจังหวัดยะยอง รวมจำนวน ๔๒๓.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดเพิ่มขึ้น ๒๐.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔๐๓.๒๕ ไร่)

๒.๒.๕ โรคลำต้นเน่า พื้นที่รับาด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระปี้ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล ยะยอง ตรัง สงขลา พัทลุง และจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๑๒,๐๓๑.๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดเพิ่มขึ้น ๖๙.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๑,๔๖๒.๘๐ ไร่)

๒.๒.๖ โรคทะลายเน่า พื้นที่รับาด ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตราด ชุมพร นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระปี้ รวมจำนวน ๑๙๓.๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๔ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดเพิ่มขึ้น ๗๑.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๑๒.๒๗ ไร่)

๒.๒.๗ โรคใบจุด พื้นที่รับาด ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สงขลา ยะลา ยะยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจังหวัดกระปี้ รวมจำนวน ๙๓.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดคงที่

๒.๒.๘ โรคใบจุดสาหาราย พื้นที่รับาด ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระปี้ ตรัง นครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร รวมจำนวน ๙๑๐.๒๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดเพิ่มขึ้น ๗.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๙๐๓.๒๑ ไร่)

๒.๒.๙ โรคก้านทางใบเน่า พื้นที่รับาด ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นราธิวาส และจังหวัดกระปี้ รวมจำนวน ๔๖๗.๐๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดคงที่

๒.๓ ศัตtruยางพารา

๒.๓.๑ โรคกรากขาว พื้นที่รับาด ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปัตตานี สงขลา กระปี้ ตราด และจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๑,๔๒๖.๐๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดลดลง ๓๓.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๔๕๙.๐๕ ไร่)

๒.๓.๒ โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พื้นที่รับาด ๑๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา สงขลา ตรัง ปัตตานี สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา พัทลุง ระนอง น่าน ชุมพร แพร่ ภูเก็ต และจังหวัดสุโขทัย รวมจำนวน ๑,๔๕๙,๔๕๖.๐๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับาดคงที่

๒.๓.๓ โรคใบร่วง พื้นที่ระบาด ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ปัตตานี ชุมพร ยะลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวน ๖,๐๐๔.๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดคงที่

๒.๓.๔ อาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง พบรการระบาด ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง สงขลา ยะลา จันทบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕,๔๓๔.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดลดลง ๗๘.๐๐ ไร่ (สัดสาห์ที่ผ่านมา ๕,๔๑๖.๐๐ ไร่)

๒.๓.๕ โรคราแป้ง พบรการระบาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๖ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดคงที่

๒.๔ ศัตรูกาแฟ

๒.๔.๑ หนองกาแฟสีแดง พบรการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๒.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดคงที่

๒.๔.๒ โรคราสนิม พบรการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่ จำนวน ๘.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดคงที่

๓. การดำเนินงานในพื้นที่ระบาด

๓.๑ การควบคุมศัตรูมะพร้าว

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่พบรการระบาดและปรากว่าร่องรอย การเข้าทำลายของหนองหัวดำมะพร้าว ได้สาธิติวิธีการผลิต ขยายแต่นเปียนบราคอน (*Bracon hebetor*) ให้กับ เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแต่นเปียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมการระบาดของหนองหัวดำในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผลิตขยาย และปล่อยแต่นเปียนอะซีโคเดส (*Asecodes hispinarum*) เพื่อควบคุมหนองของแมลงดำนามมะพร้าว ส่งเสริมให้ผลิต ขยาย และส่งเสริมให้ เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแต่นเปียนเตตรัสติกัส (*Tetrastichus brontispa*) เพื่อควบคุมดักแด้ของแมลงดำนามมะพร้าวในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนแต่นเปียนบราคอน แต่นเปียนอะซีโคเดส และแต่นเปียนเตตรัสติกัส จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาชีวศึกษา (ศทอ.) และใช้สารเคมีในพื้นที่ที่พบรการระบادرุนแรง โดยใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้ เกษตรกรหมั่นสำรวจ สำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าว ที่ถูกแมลงศัตรูมะพร้าวไปทำลาย nokaplong เพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ และได้จัดทำข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line facebookfanpage สร้างการรับรู้ กียงกับการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

๓.๒ การควบคุมศัตรูปาล์มน้ำมัน

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่พบรการระบาดของโรคและปรากว่าร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนองผีเสื้อ และกลุ่มด้วงปีกแข็ง ได้สาธิติวิธีการผลิต ขยาย เชื้อรามे�ตตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และใช้เชื้อรามेतตาไรเซียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อควบคุม การทำลายของด้วงแรด ด้วงวง และด้วงกุหลาบในระยะดักแด้ และระยะตัวหนองในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ เกษตรกรผลิต ขยาย ใช้เชื้อร่าไตรโคเดอร์มาในปาล์มน้ำมันที่เกิดโรคลำต้นเน่า เมื่อพบรดกหีดเจริญเติบโตขึ้นที่ บริเวณโคนลำต้นปาล์มน้ำมัน ให้รับกำจัด และหากบริเวณที่เนื้อเยื่อถูกทำลายออก ทบทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อร่า เช่น thairam และใช้เชื้อร่าไตรโคเดอร์มาคาดหีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ โดยผสมเชื้อสต ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ - ๑๐๐ ลิตร กรองเฉพาะน้ำนำมายใช้ เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ลุกลาม ไปยังต้นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อรามे�ตตาไรเซียม และเชื้อร่าไตรโคเดอร์มาจากศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอาชีวศึกษา (ศทอ.) และได้จัดทำข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line facebookfanpage

๓.๓ การควบคุมศัตรูทางพารา

๓.๓.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดที่พบรการระบาดของโรครากรขวยยางพารา แนะนำเกษตรกรให้ใช้วิธีการป้องกันกำจัดโรครากรขวย โดยต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในแควเตี้ยวกันข้างละ ๒ ต้น และกึงกลางระหว่างแควข้างเคียงของแควยางพาราที่พบรอยกับแควถัดไปทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางรากรและควรขุดลอกคูกวักเป็นคราวๆ

๓.๓.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดที่พบรการระบาดของโรคในร่องชันดิใหม่ของยางพารา แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการควบคุมการระบาดของโรค และแนะนำให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราให้แข็งแรง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคในร่องชันดิใหม่ของยางพาราให้กับเกษตรกรในพื้นที่

๓.๓.๓ ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดใบยางพาราที่เกิดโรคหรือวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค และบำรุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะเวลาเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย

๓.๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรคในร่องชันดิใหม่ของยางพารา พันธุ์ต้านทานปานกลาง ได้แก่ PB ๒๓๕, RRIT ๒๒๖ และ BPM ๑

๓.๓.๕ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคฯ เป็นในยางพาราอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของ การยางแห่งประเทศไทย และจัดทำข่าวเตือนการระบาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้

๓.๓.๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดการระบาดของอาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคเปลือกแห้ง และโรคหน้ายางแห้ง โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุมการระบาด ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนการระบาดผ่านทางกลุ่มไลน์ของชุมชน

๓.๔ การควบคุมศัตรูกาแฟ

๓.๔.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้และให้คำแนะนำเกษตรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งกิ่งกาแฟให้ไปร่วงเพื่อให้แสงแดดส่องถึง และเก็บเศษชาփีซอกไปทำลายทิ้ง nokเปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นกาแฟให้สมบูรณ์แข็งแรง

๓.๔.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดระบี ทำข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูกาแฟที่พบรับในกาแฟ ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น ไลน์ และเฟซบุ๊ก เป็นต้น

๓.๔.๓ รณรงค์ให้เกษตรกรสำรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๔. คำแนะนำและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
1. ศัตรูมะพร้าว	1. หนอนหัวดำมะพร้าว	<p>1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวไปเผาทำลายทิ้งอกแปลง</p> <p>2. เก็บเศษชาติที่ชำรุดออกไปทำลายทิ้งอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์</p> <p>3. ปล่อยแต่นเปี้ยนบรากอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ อัตราไร้ล่า 200 ตัว กระจายทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน</p> <p>4. ปล่อยแต่นเปี้ยนไข่ทริโครแกรมมา (<i>Trichogramma sp.</i>) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตราไร้ล่า 10 แผ่นๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน</p> <p>5. ใช้สารเคมีอามีนาเม็กติน เบโนเซอท (emamectin benzoate) 1.92% EC ดังนี้</p> <p>5.1 มะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น อัตรา 30 มิลลิลิตร/ต้น โดยเจาะลำต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใช้ดอกสว่านขนาด 4 - 5 หุน เอียงลง 45 องศา เจาะลึก 10 เซนติเมตร เจาะ 2 รู ให้รู้อยู่ตรงกันข้ามกัน ใส่สารรูละ 15 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ดินน้ำมันอุดรูทันที วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอนได้นานมากกว่า 3 เดือน</p> <p>5.2 มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกสารชนิดเดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฟลูเบนไดเอเมด (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม - คลอร์แวนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร - สปินโนแสด (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร - ลูเฟนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร <p>***โดยพ่นให้ทั่วทั้งพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน หากมีการปล่อยแต่นเปี้ยนให้ปล่อยหลังพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์</p>
	2. แมลงดำหนามมะพร้าว	<p>1. ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามกัดกิน ไปเผาทำลาย</p> <p>2. ปล่อยแต่นเปี้ยนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hipinharum</i>) อัตรา 5 - 10 มัมมี่/ไร่ ปล่อย 3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 - 10 วัน เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว</p> <p>3. ปล่อยแต่นเปี้ยนเตトラสติคัส (<i>Tetrastichus brontispa</i>) อัตรา 5 - 10 มัมมี่/ไร่ โดยปล่อยทุก ๆ 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน ควบคุมดักแด้แมลงดำหนามมะพร้าว</p> <p>4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงทางหนึบ</p>

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	3. ดาวเรด	<p>1. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงเรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ใช้ชาข่ายหรือแห้งจับปลา มาจีงขวางทิศทางลมในระดับต้นปาล์มสูง ดักจับด้วงเรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>3. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) ยัตราช 800 กรัม ต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงเรดในระยะหนอนและตัวแಡ</p> <p>4. หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ - ไดอะซินอน (diazinon) 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบบ</p>
	4. ดาววง	<p>1. ใช้ชาข่ายดักจับด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงวงในระยะหนอนและตัวแಡ</p> <p>3. ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแพลโคนต้น หรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงวงมะพร้าว</p> <p>4. ป้องกันและกำจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่างให้ระบาดในสวนมะพร้าวเพราะรอยแพลที่ด้วงแรดมะพร้าวจะเข้าไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงวงมะพร้าววางไข่และเมื่อพักออกเป็นตัวหนอนแล้วตัวหนอนของด้วงวงมะพร้าวจะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ถ่ายขึ้น</p>
	5. ไรสี่ขามะพร้าว	<p>1. ตัดทะลายและซุดอกมะพร้าวที่ไรสี่ขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง</p> <p>2. ไรสี่ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในขวัญผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถติดตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ในการพ่นทุก 2 ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 โพรพาไกต์ (propargite) 30% WP (สารกลุ่ม 12) อัตรา 30 กรัม 2.2 อะมิทราก (amitraz) 20% EC (สารกลุ่ม 19) อัตรา 40 มิลลิลิตร 2.3 กำมะถังผง* 80% WP (สารกลุ่ม UN) อัตรา 60 กรัม 2.4 ไพริดาเบน (pyridazinone) 20% WP (สารกลุ่ม 21) อัตรา 10 กรัม 2.5 สไปromีซีเฟน (spiromesifen) 24% SC (สารกลุ่ม 23) อัตรา 6 มิลลิลิตร 2.6 เอ็กซีโทโซกส์ 1.8% (สารกลุ่ม 10) อัตรา 30 มิลลิลิตร 2.7 ไฮฟลูมิโทเฟน (hexythiazox) 20% SC (สารกลุ่ม 25) อัตรา 10 มิลลิลิตร 2.8 ทีบูเฟนไพรเด (tebufenpyrad) 36% EC (สารกลุ่ม 21) อัตรา 3 มิลลิลิตร <p>* สารกำมะถังผงห้ามผสมกับสารชนิดอื่น เพราะอาจเกิดพิษกับมะพร้าวได้</p>
	6. หนอนกินใบมะพร้าว	<p>1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย นำออกไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง นำไปเผาทำลายทันที</p> <p>2. เก็บเศษจากพืชนำออกไปทำลายทั้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์</p> <p>3. หมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ</p>

พืช	ศัตรุพืช	การป้องกันกำจัด
2. ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	<p>1. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กกัดกินมาเพาทำลายทิ้ง แต่หากอยู่ในพื้นที่ที่เพบรบการระบัดของดวงวงหรือดวงสาคูไม่ควรตัดทางใบ เพราะรอยแผลจะเป็นช่องทางเข้าทำลายของดวงวง</p> <p>2. พนเชื้อปีที (<i>Bacillus thuringiensis</i>) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อปีที โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน</p> <p>3. กรณีพบการระบัดของหนอนปลอกเล็กระดับรุนแรง ให้เลือกใช้สารเคมีชนิดไดซินิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทางใบของปาล์มน้ำมัน ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 ฟลูเบนไดเอไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม 3.2 คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร 3.3 สปินโนсад (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร 3.4 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร <p>***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อสัตว์</p>
	2. ดาวแรด	<p>1. ใช้กับดักฟีโรโมนลดดาวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ใช้ชาข่ายตักจับดาวแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>3. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามิตตาไรเตียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) อัตรา 800 กรัมต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดดาวแรดในระยะหนอนและตักเดด</p>
	3. ดาวกุหลาบ	<p>1. หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เชฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บอซัลฟัน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ</p>
	4. หนอนหนาแมว	<p>แนวทางป้องกัน/แก้ไข</p> <p>1. การใช้วิธีกล</p> <p>1.1 ตัดใบอย่างที่มีหนอนหนาแมว หรือจับผึ้งเสือ ซึ่งเกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือเก็บตักเด็ดตามใบ และซอกโคนทางใบรอบต้นมาทำลาย</p> <p>1.2 ใช้กับดักแสงไฟ โดยใช้แสงไฟ black light หรือ หลอดนีออนธรรมดางานบน กะละมังพลาสติก ซึ่งบรรจุน้ำผสมผงซักฟอก ให้หลอดไฟอยู่เหนือน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร วางล่อผึ้งเสือช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ซึ่งสามารถช่วยกำจัดการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้</p> <p>2. การใช้วิธีพืช</p> <p>พนแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส <i>Bacillus thuringiensis</i> อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถทำลายกลุ่มหนอนผึ้งเสือทำลายปาล์มน้ำมัน และไม่เป็นอันตรายต่อมวลที่มีประโยชน์</p>

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
		<p>3. การใช้สารเคมี</p> <p>เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบร่องน้ำแมวเข้าทำลายบริเวณผิวใบ เฉลี่ย 20 ตัวต่อทางใบ ให้เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทางใบของปาล์มน้ำมันตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <p>3.1 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 3% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.2 อีโตเฟนพร็อกซ์ (etofenprox) 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>3.3 ฟลูบендามิเด (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม</p> <p>3.4 คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.5 พิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>3.6 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.7 อิมาเม็กติน เบโนไซเอต (emamectin benzoate) 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.8 คาร์บาริล (carbaryl) 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 10 กรัม</p> <p>3.9 แลมบดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร</p> <p>***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อสัตว์</p> <p>4. การใช้วิธีสม盆issan</p> <p>4.1 การใช้กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อในช่วงที่ดักแด้กลังออกเป็นผีเสื้อ สลับกับการใช้สารฆ่าแมลงหรือเชือแบบที่เรีย ในช่วงเป็นหนองนวยเล็ก</p> <p>4.2 การใช้เชือแบบที่เรียสลับกับการใช้สารฆ่าแมลง</p>
5. โรคลำต้นเน่า เชื้อสาเหตุ : เชื้อร่า <i>Ganoderma</i> sp.		<p>1. กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ</p> <p>2. สำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบร่องรอยเจริญเติบโตขึ้นบริเวณลำต้นให้รีบกำจัด โดยนำไม้ทำลายทั้งนอกแปลงทันที และหากบริเวณที่เนื้อยื่อที่ถูกทำลายออกทางทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อร่า เช่น thairam และค่อยตรวจสอบหากพบว่ามีดอกเหตุเกิดขึ้นอีกหรือลักษณะอาการทางใบยังไม่ปกติจะต้องทำการถกข้า แล้วทบทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อร่า</p> <p>3. บำรุงต้นปาล์มน้ำมันให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเชือไตรโคเดอร์มา อัตรา เชือสด 1 กิโลกรัม รำละเอียด 4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 - 100 กิโลกรัม หัวนรอบสั่งพุ่ม 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้นในช่วงที่มีความชื้นสูงหรือรองกันกันหลุมก่อนปลูก 100 กิโลกรัมต่อหลุม</p> <p>4. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเชือไตรโคเดอร์มา โดยผสมเชือสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 - 100 ลิตรกรองเฉพาะน้ำนำมาใช้</p>
6. โรคทะลายเน่า เชื้อสาเหตุ : เชื้อร่า <i>Marasmius palmivorus</i>		<p>1. ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ชุดอกที่ผ่อ และทะลายที่พับเป็นโรค นำออกไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง</p> <p>2. ทำความสะอาดสวน และกำจัดวัชพืช เพื่อใหม้อากาศถ่ายเทมากขึ้น</p>

พีช	ศัตรูพีช	การป้องกันกำจัด
	7. โรคใบจุด เชื้อสาเหตุ : เชื้อร้า <i>Curvularia</i> ssp., <i>Helminthosporium</i> sp. และ <i>Pestalotiopsis</i> sp.	1. กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 2. แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที 3. เมื่อพบการระบาด ให้ลดการใช้ปุ๋ยในโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที
	8. โรคใบจุดสาหร่าย เชื้อสาเหตุ : <i>Phycopeltis</i> sp.	1. สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครึ่ง 2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไวปะยังต้นอื่น ๆ 3. หากทางใบปาล์มน้ำมันแห้งมากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมผ่าน เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม 4. หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้สารเคมี คوبเปอร์ออกซิคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ
	9. โรคก้านทางใบเน่า	1. สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคก้านทางใบเน่าในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครึ่ง 2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคก้านทางใบเน่า นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ไวปะยังต้นอื่น ๆ 3. หากทางใบปาล์มน้ำมันแห้งมากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมผ่าน เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม

พีช	ศัตtruพีช	การป้องกันกำจัด
3. ยางพารา	1. โรครากรขาว เชื้อสาเหตุ : เชื้อร้า <i>Rigidoporus microporus</i> (Sw.) Overeem	<p><u>การปฏิบัติก่อนการปลูก</u></p> <p>1. ตรวจสอบก่อนโคนว่ามีต้นยางพารากลุ่มใดบ้างที่เป็นโรค และทำเครื่องหมายเพื่อเป็นพื้นที่เฝ้าระวังหลังปลูก</p> <p>2. การเตรียมดินควรทำลายตอไม้ หอนไม้เก่า และเศษรากเก่าออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นโรคควรเผาทำลายให้หมด จากนั้นໄสเพลิกหน้าดิน ตามเดดเพื่อกำจัดเชื้อราที่เจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็ก ๆ ที่หลงเหลืออยู่ในดิน</p> <p>3. ในแปลงยางพาราปลูกแทนที่เคยเป็นโรคทางระบบราช ควรเตรียมพื้นที่ปล่อยไว้ 1 - 2 ปี ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว หรือพืชไร่อายุสั้น เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสม กับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลทรรศ์ในดินและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ช่วยย่อยสลายเศษรากซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p><u>การปฏิบัติระหว่างปลูก</u></p> <p>1. การวางแผนในการปลูกแทน ควรเปลี่ยนจุดที่เจาะหลุมปลูกให้อยู่ระหว่างແ بواسเดิม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรครากรขาว</p> <p>2. แปลงที่มีประวัติการเป็นโรครากรขาวมาก่อน ควรใช้กำมะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 100 - 200 กรัมต่อหลุม และทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายรากยางพารา</p> <p>3. แปลงที่ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว ควรปลูกให้ห่างจากແ بواسเดิมประมาณ 1.50 เมตร</p> <p><u>การปฏิบัติหลังปลูก</u></p> <p>1. ควรสำรวจต้นยางพาราスマ่ำเสมอ โดยเฉพาะต้นที่ปลูกในบริเวณที่เคยเป็นโรครากรขาว หากพบต้นยางพาราแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูโคนต้น และราก หากพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคให้ขุดเผาทำลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค</p> <p>2. ต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดดูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ตัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในແ بواسเดียวกันขนาด 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างແ بواسข้างเคียงของແ بواسยางพาราที่เป็นโรค กับແ بواسตัดไปทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราก และควรขุดลอกคุกคุกไป</p> <p>3. ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยขุดร่องรอบโคนต้นกว้าง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีที่ผสมน้ำลงในร่องรอบโคนต้น 1 - 4 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดโคนต้น ใช้สารเคมีทุก 6 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 1 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 ไทรเด้มอร์ฟ (tridemorph) 75% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.2 ไซปรโคนาโซล (cyproconazole) 10% SL อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.3 โปรปิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.4 マイクロบูตานิล (mcylobutanol) 12.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.5 เฮกซาโคนาโซล (hexaconazole) 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.6 ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.7 เฟนิโคเลนิล (phenylephrine) 40% FS อัตรา 1.5 - 3 กรัม 3.8 โพรคลอร่าซ (prochloraz) 45% EC อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตร

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	<p>2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา เชื้อสาเหตุ : <i>Pestalotiopsis</i> sp. หรือ <i>Colletotrichum</i> sp.</p>	<p>1. หลีกเลี่ยงการนำกล้ามยางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดเข้าพื้นที่</p> <p>2. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>3. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>4. บำรุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ไส้เทียมะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสต 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หวานหรือใช้เชื้อสตผสมน้ำหรือน้ำผึ้งผสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งน้ำ ควรหวานหรือฉีดพ่นให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่วทั้งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ อาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารและออกซิเจนเพิ่มขึ้น</p> <p>6. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย ฉีดพ่นพุ่มใบยางพาราจากใต้ทรงพุ่มอัตรา 100 ลิตร/ไร่ ควรเริ่มพ่นเมื่อยางพาราแตกใบใหม่หลังฤดูกาลผลัดใบปกติและใบอยู่ในระยะเพสลาด โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร 6.2 โพรพิแนบ (propineb) หรือ แมโนโคเซบ (mancozeb) หรือ คลอโรทัลโนล (chlorothalonil) อัตรา 50 กรัม 6.3 เฮกซาโคนาโซล (hexaconazole) 5% SC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตร 6.4 โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 10 - 15 มิลลิลิตร
	<p>3. โรคใบร่วง เชื้อสาเหตุ : <i>Phytophthora botryosa</i> Chee หรือ <i>Phytophthora palmivora</i> (Butler)</p>	<p>1. หลีกเลี่ยงการนำกล้ามยางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดเข้าพื้นที่</p> <p>2. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>3. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>4. บำรุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ไส้เทียมะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หวานหรือใช้เชื้อสตผสมน้ำหรือน้ำผึ้งผสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งน้ำ ควรหวานหรือฉีดพ่นให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่วทั้งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ อาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารและออกซิเจนเพิ่มขึ้น ช่วยบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง</p>

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด																										
	4. โรคราแป้ง เชื้อสาเหตุ : <i>Oidium heveae</i> Steinm	<ol style="list-style-type: none"> หมั่นสำรวจสวนยางพารา เขตที่มีการระบาดของโรครุนแรง ไม่ควรปลูกยางพันธุ์อ่อนแอง เช่น PB 235 สถาบันวิจัยยาง 226 การเลือกพันธุ์ยางควรคำนึงถึงลักษณะการผลัดใบพันธุ์ยางที่ผลัดใบเดียวจะหลีกเลี่ยงโรคได้ดีกว่า เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำ เพื่อให้ใบที่ผลิตออกมาใหม่สมบูรณ์และแก่เร็ว พนระยะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อ หากพบการระบาดของโรค ใช้สารเคมีพ่นใบยางอ่อน ดังนี้ <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">สารเคมี</th> <th rowspan="2">อัตราการใช้</th> <th rowspan="2">วิธีการใช้</th> </tr> <tr> <th>ชื่อสามัญ</th> <th>% สารออกฤทธิ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เบโนมิล (benomyl)</td> <td>50% WP</td> <td rowspan="2">20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร</td> <td rowspan="2">ฉีดพ่นใบยางอ่อนทุกสัปดาห์ ในช่วงที่เริ่มพับโรค</td> </tr> <tr> <td>คาร์เบนดาซิม (carbendazim)</td> <td>50% WP</td> </tr> <tr> <td>ซัลเฟอร์ (sulfur)</td> <td>80% WP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ไทริดีมอร์ฟ* (tridemorph)</td> <td>75% EC</td> <td>10 มิลลิ ต่อน้ำ 20 ลิตร</td> <td></td> </tr> <tr> <td>กำมะถันผง</td> <td></td> <td>1.5-4 กก.ต่อไร่</td> <td>พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอาศัย ประโยชน์จากน้ำค้าง</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>* ห้ามใช้อัตราสูงกว่าคำแนะนำ เพราะจะทำให้ใบ焉焉</p>			สารเคมี		อัตราการใช้	วิธีการใช้	ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์	เบโนมิล (benomyl)	50% WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่นใบยางอ่อนทุกสัปดาห์ ในช่วงที่เริ่มพับโรค	คาร์เบนดาซิม (carbendazim)	50% WP	ซัลเฟอร์ (sulfur)	80% WP			ไทริดีมอร์ฟ* (tridemorph)	75% EC	10 มิลลิ ต่อน้ำ 20 ลิตร		กำมะถันผง		1.5-4 กก.ต่อไร่	พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอาศัย ประโยชน์จากน้ำค้าง
สารเคมี		อัตราการใช้	วิธีการใช้																									
ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์																											
เบโนมิล (benomyl)	50% WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่นใบยางอ่อนทุกสัปดาห์ ในช่วงที่เริ่มพับโรค																									
คาร์เบนดาซิม (carbendazim)	50% WP																											
ซัลเฟอร์ (sulfur)	80% WP																											
ไทริดีมอร์ฟ* (tridemorph)	75% EC	10 มิลลิ ต่อน้ำ 20 ลิตร																										
กำมะถันผง		1.5-4 กก.ต่อไร่	พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอาศัย ประโยชน์จากน้ำค้าง																									
	5. อาการเปลือกแห้ง/ อาการหน้ายางแห้ง (Tapping panel dryness (TPD))	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางให้น้ำน้ำผิดปกติและน้ำยาง الجاري หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน และวบarmริงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด หันน้ำต้นยางที่แสดงอาการเปลือกแห้งชี้ขวาจะสามารถกรีดได้เป็นปกติอีกหลังจากหยุดกรีดไประยะหนึ่ง ในแปลงปลูกที่เกษตรกรใช้ระบบกรีดถี่ เช่น กรีดทุกวัน สามวันเวนวัน หรือมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เมื่อตรวจพบว่า การให้ผลผลิตของต้นยางลดลง ควรปรับระบบกรีดใหม่ เพื่อให้ต้นยางมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการสร้างน้ำยางขึ้นมาทดแทนในแต่ละครั้งกรีด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ดินปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีอินทรีย์ตั้งแต่ 10% ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของดิน ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น การระบายน้ำอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบระบายน้ำสามารถดูดซึมน้ำอาหารได้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์ตั้งแต่ต้นแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน 																										

พีช	คัตtruพีช	การป้องกันกำจัด
		<p>3. การกรีดยา</p> <p>3.1 ไม่ควรเปิดกรีดต้นยางขนาดเล็ก หรือต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด การเปิดกรีดต้นยางควรคำนึงถึงขนาดของต้นยางไม่ใช่อายุของต้นยาง ขนาดของต้นยางแสดงถึงความพร้อมในการเหนี่ยวยาง การเปิดกรีดต้นยางที่มีขนาดเล็ก จะได้รับผลผลิตน้อย การกรีดหนึ่งในสามลำต้นทุกวันกับต้นขนาดเล็ก ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อครั้งลดลง 30 - 51% และผลผลิตสะสมต่อปีลดลง 6 - 43% นอกจากนี้การกรีดต้นยางขนาดเล็ก ยังมีผลทำให้ต้นยางมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำกว่าต้นที่ได้ขนาดเปิดกรีด 12 - 28%</p> <p>3.2 ไม่ควรกรีดยางทุกวัน หรือกรีดติดต่อกันหลายวัน เพราะแม้ว่าจะได้ผลผลิตสะสมต่อปีสูงเนื่องจากจำนวนวันกรีดมาก แต่ผลผลิตต่อครั้งกรีดต่ำ ปริมาณเนื้อยางแห้งลดลง และจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตรวมในระยะยาว</p> <p>3.3 ควรหยุดกรีดในระยะที่ต้นยางมีการผลลัพธ์ใหม่</p> <p>4. การใช้สารเคมีร่นน้ำยาง</p> <p>4.1 ส่วนยางที่ใช้สารเคมีร่นน้ำยางคร้มต้นยางที่เจริญเติบโตดี ต้นโต เปลือกหนา อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ควรใช้กับต้นยางหนุ่มหรือเพิ่งเปิดกรีด</p> <p>4.2 ควรใช้กับระบบกรีดที่มีวันหยุด ระบบกรีดถ้าไม่เหมาะสมสมต่อการใช้สารเคมีร่นน้ำยางพบว่า การใช้สารเคมีร่นน้ำยางกับระบบกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นวัน จะให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดสูงกว่ากรีดวันเว้นวัน 12 - 23% ส่วนการกรีดถี่ โดยกรีดทุกวัน กรีดสองวันเว้นวัน กรีดสามวันเว้นวัน กรีด 4 - 7 วันเว้นวัน ไม่ควรใช้สารเคมีร่นน้ำยาง เพราะต้นยางสูญเสียน้ำยางมาก ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการเปลือกแห้ง เพิ่มมากขึ้น</p> <p>4.3 ไม่ควรใช้สารเคมีร่นน้ำยางกับพันธุ์ยางกลุ่มที่มีการตอบสนองต่อสารเคมีร่นน้ำยางน้อย ได้แก่ BPM 24, PB 235, สถาบันวิจัยยาง 251 และไม่ควรใช้สารเคมีร่นน้ำยาง กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อการเกิดอาการเปลือกแห้งได้ด้วย เช่น BPM 24, PB 235, PB 255, PB 260</p> <p>4.4 ไม่ควรใช้สารเคมีร่นน้ำยางในช่วงแล้ง ขณะต้นยางเริ่มผลัดใบ และผลลัพธ์ในใหม่นี้เนื่องจากสารเคมีร่นน้ำยางยึดเวลาการให้ผลของน้ำยาง และได้ผลผลิตมากขึ้น ต้นยางมีการสูญเสียน้ำจากลำต้น</p> <p>4.5 ช่วงอากาศหนาน้ำยางจะไหวนานกว่าปกติ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่ควรใช้สารเคมีร่นน้ำยาง</p> <p>4.6 ความถี่ในการใช้ ในทางปฏิบัติควรใช้สารเคมีร่นน้ำยาง 2.5% ไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี (3 - 6ครั้ง) การใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน จะให้ผลตอบแทนสูงในระยะ 3 - 4 ปีแรก หลังจากนั้นต้นยางจะตอบสนองต่อสารเคมีร่นน้ำยางลดลง ที่มา : อารมณ์ โรณสุจิตร ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี</p>
4. กาแฟ	หนอนกาแฟสีแดง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิงและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ 2. หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจ้ากิงกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดกิงและลำต้นออกไปเผาทำลาย nok แปลง 3. ฉีดพ่นสารฆ่าแมลง Fenitrothion (fenitrothion) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และนำไปทาด้วยแปรงทาสีบริเวณลำต้นกาแฟให้ทั่ว หากใช้ฉีดพ่นให้ใช้ในอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

๕.การคาดการณ์ศัตรูไม้เย็นตัน ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๗

ภาคเหนือ

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ และโรคใบจุดสาหร่าย
- ยางพารา ระวัง โรคراكขาว โรคใบร่วง และอาการเปลือกแห้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคراكขาว โรคใบร่วง โรคเส้นดำ และอาการเปลือกแห้ง

ภาคกลาง และภาคตะวันตก

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ โรคใบจุด และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคراكขาว โรคใบร่วง โรคเส้นดำ และอาการเปลือกแห้ง

ภาคตะวันออก


- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง และอาการเปลือกแห้ง

ภาคใต้


- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม ด้วงแรด และหนอนกินใบมะพร้าว
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ ด้วงแรด และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง และอาการเปลือกแห้ง

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของคัตรูไม้ยืนต้น ปี ๒๕๖๗


ภาพรวมทั่วประเทศ




กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของคัตตุรุมะพร้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗




ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗


กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูป่าล้มไม้ มัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗




ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗


กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของคัตตุรยางพารา ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗




ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูภัย ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗



ปี ๒๕๖๖



ปี ๒๕๖๗