



รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอրักขาพีชและจัดการดินปุ๋ย

ໂທ. ០ ២៣៥៥ ១៥៤៤ ໂທສາງ ០ ២៣៥៥ ១៦៧៦

E-mail : doae.pmd2566@gmail.com



สถานการณ์การระบาดศัตรุพืชที่สำคัญ

ศัตรุไม้ยืนต้น

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ๑.๑ พื้นที่ป่าลูกอมพร้าว | ทั้งหมด ๖๓ จังหวัด | รวมพื้นที่ยืนต้น | ๑,๐๔๙,๐๗๖.๘๔ ไร่ |
| ๑.๒ พื้นที่ป่าลูกปาร์มนำมัน | ทั้งหมด ๖๗ จังหวัด | รวมพื้นที่ยืนต้น | ๕,๐๙๔,๖๘๓.๔๗ ไร่ |
| ๑.๓ พื้นที่ป่าลูกยางพารา | ทั้งหมด ๖๖ จังหวัด | รวมพื้นที่ยืนต้น | ๘๙,๕๓๑,๖๑๔.๘๔ ไร่ |
| ๑.๔ พื้นที่ป่าลูกกาแฟ | ทั้งหมด ๖๐ จังหวัด | รวมพื้นที่ยืนต้น | ๙๔,๕๓๕.๘๗ ไร่ |

๒. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่สำคัญ

๒.๑ ศัตรุมະพร้าว

๒.๑.๑ หนองหัวคำ พื้นที่篮板 ๒๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม ราชบุรี ชุมพร กรุงเทพมหานคร สงขลา ฉะเชิงเทรา สตูล สมุทรปราการ กระปี จันทบุรี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา ชุมพร ปัตตานี นครปฐม ระยอง เพชรบุรี นราธิวาส และจังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวน ๔๓,๔๐๐.๔๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๐ ของพื้นที่ปลูกพื้นที่篮板ลดลง ๒๗๗.๐๐ ไร่ (สัดคละที่ผ่านมา ๔๓,๖๗๗.๔๒ ไร่) แบ่งเป็น

- ๑) การทำลายระดับน้อย จำนวน ๙,๗๙๒.๗๙ ไร่ (๒๑.๑๔ %)
๒) การทำลายระดับปานกลาง จำนวน ๒๖,๘๗๔.๑๐ ไร่ (๖๑.๙๓ %)
๓) การทำลายระดับรุนแรง จำนวน ๗,๓๓๐.๔๕ ไร่ (๑๖.๗๙ %)

๒.๑.๒ แมลงดำหานม พื้นที่篮板 ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช

ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล เพชรบุรี สงขลา ตราด ระเบียง พังงา ภูเก็ต สมุทรสงคราม ตรัง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ยะลา ยะยอง สระแก้วและจังหวัดปัตตานี รวมจำนวน ๑๒,๗๐๓.๒๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐ ของพื้นที่ป่าลึก พื้นที่ระบบดินดง ๒๔๘.๗๕ ไร่ (สัดส่วนที่ผ่านมา ๑๒,๕๕๒.๐๔ ไร่) แบ่งเป็น

- ๑) การทำลายระดับน้อย จำนวน ๖,๐๗๔.๒๔ ไร่ (๔๗.๘๒ %)
 ๒) การทำลายระดับปานกลาง จำนวน ๖,๐๙๙.๘๐ ไร่ (๔๗.๘๔ %)
 ๓) การทำลายระดับรุนแรง จำนวน ๔๓๙.๒๕ ไร่ (๔.๒๔ %)

๒.๑.๓ ด้วยแลด พื้นที่ระบาด ๒๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช

ສຕູລ ຕຣາດ ສຖາງຄູ່ຮານີ ສມຸທຣສາກເຮົາ ສມຸທຣສົງຄຣາມ ຂະເຊົາເທຣາ ເພີ້ວບູ້ ຂລບູ້ ກະປື້ ນຄປະໂຮມ ສມຸທຣປະກາງ
ສັງຂລາ ຈັນທບູ້ ກຽມທຳມໍາຫານຄຣ ກູ່ເກີຕ ພັງກາ ຮະຍອງ ປັດຕານີ ແລະ ຈັງຫວັດຮາຈບູ້ ລວມຈຳນວນ ៥,๓๗៥.៨៦ ໄວ
ຄືດເປັນຮ້ອຍລະ ០.៥១ ຂອງພື້ນທີ່ປຸລູກ ພື້ນທີ່ຮະບາດເມື່ອຂຶ້ນ ၃៥.၅၀ ໄວ (ສັບດາທີ່ຝ່າງນາ ៥,၃၇၅.၈၁ ໄວ)

๒.๑.๔ ด้วยงบ พื้นที่ระบบ ๓๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัตร้าด ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา

สุราษฎร์ธานี สมุทรสงคราม จันทบุรี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ พังงา เพชรบุรี และจังหวัดระปีรวมจำนวน ๙๒๗.๔๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดลดลง ๙.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๙๓๖.๔๕ ไร่)

๒.๑.๕ ไรสีขามะพร้าว พื้นที่รับด ๓๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ชุมพร สารแก้ว บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร ตราด ชัยภูมิ และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๔๓๐.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดลดลง ๑๕.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔๔๔.๗๕ ไร่)

๒.๒ ศัตรูป่ามั่น้ำมัน

๒.๒.๑ หนองปลอกเล็ก พื้นที่รับด ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ยะลา กระบี่ และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๙๕๖.๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดลดลง ๒๔๔.๒๕ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๒๐๑.๗๘ ไร่)

๒.๒.๒ ตัวงแ雷ด พื้นที่รับด ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด ตระ สงขลา จันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน ๑,๓๐๓.๓๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดลดลง ๙.๕๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๓๑๒.๘๘ ไร่)

๒.๒.๓ ตัวงกุหลาบ พื้นที่รับด ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ สตูล สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส จันทบุรี และจังหวัดพังงา รวมจำนวน ๒๔๗.๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดเพิ่มขึ้น ๑๓.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๒๕๖.๓๐ ไร่)

๒.๒.๔ โรคคำตันเน่า พื้นที่รับด ๓๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล ตระ ระยอง สงขลา ชลบุรี ประจำวบคีรีขันธ พัทลุง จันทบุรี และจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๑๒,๑๔๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดลดลง ๑๖.๕๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๒,๑๖๔.๐๐ ไร่)

๒.๒.๕ โรคทะลายเน่า พื้นที่รับด ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ตราด สงขลา ชุมพร นราธิวาส และจังหวัดกระบี่ รวมจำนวน ๑๖๙.๗๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดลดลง ๑.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๗๐.๗๗ ไร่)

๒.๒.๖ โรคใบจุด พื้นที่รับด ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สงขลา ยะลา ระยอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส และจังหวัดกระบี่ รวมจำนวน ๑๑๐.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดคงที่

๒.๒.๗ โรคใบจุดสาหร่าย พื้นที่รับด ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตระ กระบี่ นครศรีธรรมราช ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน ๓๑๑.๒๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดลดลง ๓๓.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๓๒๔.๒๑ ไร่)

๒.๓ ศัตรูยางพารา

๒.๓.๑ โรครากรขาว พื้นที่รับด ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตระ กระบี่ ชุมพร ปัตตานี ตราด และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๒,๐๕๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดคงที่

๒.๓.๒ โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พื้นที่รับด ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี สุไหทัย น่าน แพร่ พังงา และจังหวัดกระบี่ รวมจำนวน ๑๒๐,๐๖๕.๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดคงที่

๒.๓.๓ โรคใบร่วง พื้นที่รับด ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา ปัตตานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ และจังหวัดแพร่ รวมจำนวน ๒,๖๘๘.๒๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดเพิ่มขึ้น ๓๖๑.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๒,๓๓๗.๒๗ ไร่)

๒.๓.๔ อาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง พบรการรับด ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตระ สงขลา สงขลา สุราษฎร์ธานี ยโสธร นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และจังหวัดสตูล จำนวน ๔,๘๙๒.๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่รับดเพิ่มขึ้น ๒๗.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔,๘๖๕.๖๕ ไร่)

๒.๔ ศัตรูกาแฟ

๒.๔.๑ หนอนกาแฟสีแดง พบรากระบัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๒.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบัดคงที่

๒.๔.๒ โรคราสนิม พบรากระบัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด الغربية จำนวน ๘.๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบัดคงที่

๓. การดำเนินงานในพื้นที่ระบัด

๓.๑ การควบคุมศัตรูแมลงพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่พบรากระบัดและปราภูร่องรอย การเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว ได้สาธิติวิธีการผลิต ขยายแต่นเปียนบราคอน (*Bracon hebetor*) ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแต่นเปียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมการระบัดของหนอนหัวดำในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผลิตขยาย และปล่อยแต่นเปียนบราคอน (*Asecodes hispinarum*) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำนามมะพร้าว ส่งเสริมให้ผลิต ขยาย และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแต่นเปียนเตตระสติกัส (*Tetrastichus brontispae*) เพื่อควบคุมดักแด้ของแมลงดำนามมะพร้าวในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนแต่นเปียนบราคอน แต่นเปียนบราคอน และแต่นเปียนเตตระสติกัส จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษษาพืช (ศทอ.) และใช้สารเคมีในพื้นที่ที่พบรากระบัดรุนแรง โดยใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ ผู้ระหว่าง ติดตามสถานการณ์การระบัดอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าว ที่ถูกแมลงศัตรูแมลงพืชไปทำลาย nokapeng เพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ และได้จัดทำข่าวเตือนการระบัดศัตรูพืช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line facebookfanpage สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูแมลงพืช

๓.๒ การควบคุมศัตรูป่าล้มน้ำมัน

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่พบรากระบัดของโรคและปราภูร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูป่าล้มน้ำมัน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหนอนฝีเสื้อ และกลุ่มด้วงปีกแข็ง ได้สาธิติวิธีการผลิต ขยาย เชื้อรากเมตตาไรเชียม (*Metarhizium anisopliae*) ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และใช้เชื้อรากเมตตาไรเชียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อควบคุมการทำลายของด้วงแรด ด้วงงวง และด้วงกุหลาบในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต ขยาย ใช้เชื้อรากโดยรีโนไม่ป่าล้มน้ำมันที่เกิดโรคลำต้นเน่า เมื่อพบดอกเหตุเดริญเติบโตขึ้นที่บริเวณโคนลำต้นป่าล้มน้ำมัน ให้รับกำจัด และหากบริเวณที่เนื้อเยื่อถูกทำลายออก ทบทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อราก เช่น thairiram และใช้เชื้อรากโดยรีโนมาเรดหรือนีดพัฟบริเวณรอบโคนต้นและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ โดยผสมเชื้อสอด ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ - ๑๐๐ ลิตร กรองเฉพาะน้ำนำมاءใช้ เพื่อควบคุมการระบัดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อรากเมตตาไรเชียม และเชื้อรากโดยรีโนมาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษษาพืช (ศทอ.) และได้จัดทำข่าวเตือนการระบัดศัตรูพืช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line facebookfanpage

๓.๓ การควบคุมศัตรูധารา

๓.๓.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดที่พบรากระบัดของโรคราษฎรധารา แนะนำเกษตรกรให้ใช้วิธีการป้องกันกำจัดโรคราษฎรധารา โดยต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในแ Kawadeiyakan ข้างละ ๒ ต้น และกีงคลางระหว่างແຕวข้างเคียงของแ Kawadeiyakan ที่พบรากกับแ Kawadeiyakan ไปทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราษฎร และควรขุดลอกคูทุกปี

๓.๓.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดที่พบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการควบคุมการระบาดของโรค และแนะนำให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราให้แข็งแรง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคบริร่วงชนิดใหม่ของยางพาราให้กับเกษตรกรในพื้นที่

๓.๓.๓ ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดใบยางพาราที่เกิดโรคหรือวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค และบำรุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะเวลาเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย

๓.๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรคบริร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พันธุ์ต้านทานปานกลาง ได้แก่ PB ๒๓๕, RRIT ๒๒๖ และ BPM ๑

๓.๓.๕ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคราแป้งในยางพาราอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของ การยางแห่งประเทศไทย และจัดทำข่าวเตือนการระบาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้

๓.๓.๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดการระบาดของอาการเบลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาการเบลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคเบลือกแห้ง และโรคหน้ายางแห้ง โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุมการระบาด ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนการระบาดผ่านทางกลุ่มไลน์ของชุมชน

๓.๔ การควบคุมศัตรูภาพ

๓.๔.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้และให้คำแนะนำเกษตรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งกิ่งกาแฟให้ปร่องเพื่อให้แสงแดดส่องถึง และเก็บเศษชาփะออกไปทำลายทิ้ง nokเปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นกาแฟให้สมบูรณ์แข็งแรง

๓.๔.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดกระปี ทำข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูภาพที่พบในกาแฟ ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอและเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น line facebook เป็นต้น

๓.๔.๓ รณรงค์ให้เกษตรกรสำรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๔. คำแนะนำและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด

พืช	คัตทรูพีช	การป้องกันกำจัด
1. ศัตรูแมลงพืช	1. หนอนหัวดำมะพร้าว	<p>1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง</p> <p>2. เก็บเศษชาภีซึ่งนำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์</p> <p>3. ปล่อยแต่นเปียนบราคอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ อัตราเริ่ม 200 ตัว กระจายทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน</p> <p>4. ปล่อยแต่นเปียนไข่ทริโครแกรมมา (<i>Trichogramma sp.</i>) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตราเริ่ม 10 แผ่นๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน</p> <p>5. ใช้สารเคมีอิมามีกติน บีโนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92% EC ดังนี้</p> <p>5.1 มะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยเจาะลำต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใช้ดอกสว่านขนาด 4 - 5 หุน เอียงลง 45 องศา เจาะลึก 10 เซนติเมตร เจาะ 2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใส่สารรูละ 15 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ดินน้ำมันอุดรูทันที วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอนได้นานมากกว่า 3 เดือน</p> <p>5.2 มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำนาตalaให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกสารชนิดเดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฟลูเบนไดเอเมด (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม - คลอรานทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร - สปีโนแนสต (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร - ลูเฟนูرون (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร <p>***โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน หากมีการปล่อยแต่นเปียนให้เปลี่ยนห้องพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์</p>
	2. แมลงดำหนามะพร้าว	<p>1. ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามกัดกิน ไปเผาทำลาย</p> <p>2. ปล่อยแต่นเปียนอะเซโคเดส (<i>Asecodes hipinarum</i>) อัตรา 5 - 10 มัมมี่/ไร่ ปล่อย 3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 - 10 วัน เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว</p> <p>3. ปล่อยแต่นเปียนเตトラสติกัส (<i>Tetrastichus brontispa</i>) อัตรา 5 - 10 มัมมี่/ไร่ โดยปล่อยทุกๆ 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน ควบคุมดักแด่แมลงดำหนามมะพร้าว</p> <p>4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงทางหนึ่ง</p>

พืช	ศัตรุพืช	การป้องกันกำจัด
	3. ด้วงแรด	<p>1. ใช้กับดักฟีโรไมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ใช้ตาข่ายหรือแหล่งป่า มาขึ้นวางทิศทางลมในระดับต้นปาล์มสูง ดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>3. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามาเตตราเรซิยม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) อัตรา 800 กรัม ต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและตักแต้</p> <p>4. หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ - ไดอะซิโนน (diazinon) 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณ คอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบบ</p>
	4. ด้วงวง	<p>1. ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามาเตตราเรซิยม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงวง ในระยะหนอนและตักแต้</p> <p>3. ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแพลโคนต้น หรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงวงมะพร้าว</p> <p>4. ป้องกันและกำจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่างให้ระบบในสวนมะพร้าวเพราะรอยแผล ที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงวงมะพร้าววางไข่และเมื่อฟักออกเป็น ตัวหนอนแล้วตัวหนอนของด้วงวงมะพร้าวจะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น</p>
	5. ไรสี่ขามะพร้าว	<p>1. ตัดทรายและช่อดอกมะพร้าวที่ไรสี่ขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้ง นอกแปลง</p> <p>2. ไรสี่ขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายในข้าวผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไร ไม่สามารถติดตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะ มะพร้าวติดจันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขา มะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือก สารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลับกลุ่มสาร ตามกลไกการอกรถที่ในการพ่นทุก 2 ครั้ง ดังนี้</p> <p>2.1 โพรพาไกท์ (propargite) 30% WP (สารกลุ่ม 12) อัตรา 30 กรัม</p> <p>2.2 อะมิทรัช (amitraz) 20% EC (สารกลุ่ม 19) อัตรา 40 มิลลิลิตร</p> <p>2.3 กำมะถังผง* 80% WP (สารกลุ่ม UN) อัตรา 60 กรัม</p> <p>2.4 ไพริดาเบน (pyridazinone) 20% WP (สารกลุ่ม 21) อัตรา 10 กรัม</p> <p>2.5 สไปромีซิเฟน (spiromesifen) 24% SC (สารกลุ่ม 23) อัตรา 6 มิลลิลิตร</p> <p>2.6 เอกซ์ไทอซอกซ์ 1.8% (สารกลุ่ม 10) อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>2.7 ไฮฟลูมีโทเฟน (hexythiazox) 20% SC (สารกลุ่ม 25) อัตรา 10 มิลลิลิตร</p> <p>2.8 ทีบูเฟนไพรเด (tebufenpyrad) 36% EC (สารกลุ่ม 21) อัตรา 3 มิลลิลิตร</p> <p>* สารกำมะถังผงห้ามผสมกับสารชนิดอื่น เพราะอาจเกิดพิษกับมะพร้าวได้</p>
	6. หนอนกินใบมะพร้าว	<p>1. ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง</p>

		<p>นำไปเผาทำลายทันที</p> <p>2. เก็บเศษชากรีซนำออกไปทำลายทิ้งนอกรถบิน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์</p> <p>3. หมั่นสำรวจสวนมะพร้าวอย่างสม่ำเสมอ</p>
--	--	---

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
2. ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	<p>1. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กกัดกินมาเผาทำลายทิ้ง แต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบการระบาดของด้วงงวงหรือด้วงสาคูไม่ควรตัดทางใบ เพราะรอยแผลจะเป็นช่องทางเข้าทำลายของด้วงงวง</p> <p>2. พ่นเชื้อปีที (<i>Bacillus thuringiensis</i>) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับเป็น 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อปีที โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน</p> <p>3. กรณีพบการระบาดของหนอนปลอกเล็กระดับรุนแรง ให้เลือกใช้สารเคมีนิดไดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทางใบของปาล์มน้ำมัน ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <p>3.1 ฟลูเบนไดเอมิด (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม</p> <p>3.2 คลอแรนทรานิลิโพรอล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.3 สปินโนแนสต์ (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.4 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อสัตว์</p>
	2. ด้วงแรด	<p>1. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>3. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามิตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) อัตรา 800 กรัมต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและตักเต้</p>
	3. ด้วงกุหลาบ	<p>1. หมั่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เชพวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์บโซลฟัน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ</p>
	4. หนอนหน้าเมwa	<p>แนวทางป้องกัน/แก้ไข</p> <p>1. การใช้วิธีกล</p> <p>1.1 ตัดใบยออยที่มีหนอนหน้าเมwa หรือจับผึ้งเสือ ซึ่งเก้านิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบปาล์มน้ำมัน หรือเก็บตักเด็ดตามใบ และซอกโคนทางใบรอบต้นมาทำลาย</p> <p>1.2 ใช้กับดักแสงไฟ โดยใช้แสงไฟ black light หรือ หลอดนีออนธรรมดาวางบนกะละมังพลาสติก ซึ่งบรรจุน้ำผสมผงซักฟอก ให้หลอดไฟอยู่เหนือน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร วางล่อผึ้งเสือช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ซึ่งสามารถช่วยกำจัดการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้</p> <p>2. การใช้วิธีวิธี</p> <p>พ่นแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส <i>Bacillus thuringiensis</i> อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถทำลายกลุ่มหนอนผึ้งเสือทำลายปาล์มน้ำมัน และไม่</p>

	เป็นอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์
--	---------------------------------

พืช	ศัตรุพืช	การป้องกันกำจัด
		<p>3. การใช้สารเคมี</p> <p>เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบร่องน้ำมันอยู่บนใบ ทำลายบริเวณผิวใบ เฉลี่ย 20 ตัวต่อหางใบ ให้เลือกใช้สารเคมีชนิดไดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทางใบของปาล์มน้ำมัน ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <p>3.1 เดล塔เมทริน (deltamethrin) 3% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.2 อีโตเฟนพร็อกซ (etofenprox) 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>3.3 ฟลูบендามิเด (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม</p> <p>3.4 คลอรานทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.5 พิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>3.6 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.7 อิมาเม็กติน เบนโซอेट (emamectin benzoate) 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.8 คาร์บาริล (carbaryl) 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 10 กรัม</p> <p>3.9 แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร</p> <p>***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อสัตว์</p> <p>4. การใช้วิธีสม盆agan</p> <p>4.1 การใช้กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อในช่วงที่ดักแด้กำลังออกเป็นผีเสื้อ ลับกับการใช้สารฆ่าแมลงหรือเชือเบคทีเรีย ในช่วงเป็นหนองน้ำร้ายเล็ก</p> <p>4.2 การใช้เชือเบคทีเรียลับกับการใช้สารฆ่าแมลง</p>
5. โรคลำต้นเน่า เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา <i>Ganoderma</i> sp.		<p>1. กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ</p> <p>2. สำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบร่องรอยเจริญเติบโตขึ้นบริเวณลำต้น ให้รับกำจัด โดยนำไปทำลายทั้งนอกแปลงทันที และถากบริเวณที่เนื้อยื่นที่ถูกทำลายออก หากบดด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น thairam และคอยตราราบทากพบร่วมกับยาฆ่าเชื้อรา</p> <p>3. บำรุงต้นปาล์มน้ำมันให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา เชือสด 1 กิโลกรัม รำละเอียด 4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 - 100 กิโลกรัม ห่ว่านรอบทรงพุ่ม 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้นในช่วงที่มีความชื้นสูงหรือรองกันกันหลุมก่อนปลูก 100 กิโลกรัมต่อหลุม</p> <p>4. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคน้ำต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยผสมเชือสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 - 100 ลิตรกรองเฉพาะน้ำนำมาใช้</p>
6. โรคทะลายเน่า เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา <i>Marasmius palmivorus</i>		<p>1. ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฟ่อ และทะลายที่พับเป็นโรค นำออกไปเผาทำลายทั้งนอกแปลง</p> <p>2. ทำความสะอาดสวน และกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น</p>

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	7. โรคใบจุด เชื้อสาเหตุ : เชื้อร้า <i>Curvularia</i> ssp., <i>Helminthosporium</i> sp. และ <i>Pestalotiopsis</i> sp.	1. กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 2. แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที 3. เมื่อพบการระบาด ให้ลดการใช้ปุ๋ยในโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที
	8. โรคใบจุดสาหร่าย เชื้อสาเหตุ : <i>Phycopeltis</i> sp.	1. สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครึ่ง 2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ร์ไปยังต้นอื่น ๆ 3. หากทางใบปาล์มน้ำมันแห้งมากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมผ่าน เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม 4. หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้สารเคมี คوبเปอร์ออกซิคลอไรต์ (copper oxychloride) 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ
	9. โรคก้านทางใบเน่า	1. สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคก้านทางใบเน่าในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสัปดาห์ละครึ่ง 2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคก้านทางใบเน่า นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ร์ไปยังต้นอื่น ๆ 3. หากทางใบปาล์มน้ำมันแห้งมากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมผ่าน เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม

พืช	ศัตtruพืช	การป้องกันกำจัด
3. ยางพารา	1. โรครากรข้าว เชื้อสาเหตุ : เชื้อร้า <i>Rigidoporus microporus</i> (Sw.) Overeem	<p><u>การปฏิบัติก่อนการปลูก</u></p> <p>1. ตรวจสอบก่อนโคนว่ามีต้นยางพารากลุ่มใดบ้างที่เป็นโรค และทำเครื่องหมายเพื่อเป็นพื้นที่เฝ้าระวังหลังปลูก</p> <p>2. การเตรียมดินควรทำลายตอไม้ หอนไม้เก่า และเศษรากเก่าออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นโรคควรเผาทำลายให้หมด จากนั้นได้ผลิกหน้าดินตากแดดเพื่อกำจัดเชื้อร้าที่เจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็ก ๆ ที่หลงเหลืออยู่ในดิน</p> <p>3. ในแปลงยางพาราปลูกแทนที่เคยเป็นโรคทางระบบ根本 ควรเตรียมพื้นที่ปล่อยว่างไว้ 1 - 2 ปี ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว หรือพืชไร้อายุสั้น เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อร้าในดินและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ช่วยย่อยสลายเศษรากซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p><u>การปฏิบัติระหว่างปลูก</u></p> <p>1. การวางแผนในการปลูกแทน ควรเปลี่ยนจุดที่เจาะหลุมปลูกให้อยู่ระหว่างແ容貌เดิมเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคจากข้าว</p> <p>2. แปลงที่มีประวัติการเป็นโรครากรข้าวมาก่อน ควรใช้กำมะถันผงสมูนในหลุมปลูก 100 - 200 กรัมต่อหลุม เลี้ยวทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายรากยางพารา</p> <p>3. แปลงที่ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว ควรปลูกให้ห่างจากแฉ่ายางพาราประมาณ 1.50 เมตร</p> <p><u>การปฏิบัติหลังปลูก</u></p> <p>1. ควรสำรวจต้นยางพาราสม่ำเสมอ โดยเฉพาะต้นที่ปลูกในบริเวณที่เคยเป็นโรครากรข้าว หากพบต้นยางพาราแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูโคนต้นและราก หากพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคให้ขุดเผาทำลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค</p> <p>2. ต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคุกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบในແ容貌เดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึงกลางระหว่างแฉาข้างเคียงของแฉ่ายางพาราที่พับโรคกับแฉาถัดไปทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราก และควรขุดลอกคุกๆ กี</p> <p>3. ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันการเกิดโรคโดยขุดร่องรอบโคนต้นกว้าง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีที่ผสมน้ำลงในร่องรอบโคนต้น 1 - 4 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดโคนต้น ใช้สารเคมีทุก 6 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 1 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 ไทรดีมอร์ฟ (tridemorph) 75% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.2 ไซโพรโคนาโซล (cyproconazole) 10% SL อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.3 โพรปิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.4 マイクロบิวทานิล (myclobutanil) 12.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.5 เฮกซาโโนโซล (hexaconazole) 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.6 ไคฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.7 เฟนิโคลนิล (phenylephrine) 40% FS อัตรา 1.5 - 3 กรัม 3.8 โพรคลอร่าซ (prochloraz) 45% EC อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตร

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	<p>2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา เชื้อสาเหตุ : <i>Pestalotiopsis</i> sp. หรือ <i>Colletotrichum</i> sp.</p>	<p>1. หลีกเลี่ยงการนำกล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดเข้าพื้นที่</p> <p>2. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>3. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>4. บำรุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับภาระของการเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสต 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หัว่านหรือใช้เชื้อสตผสมน้ำหรือน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งนี้ ควรห่ว่านหรือฉีดพ่นให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ อาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารและออกซิเจนเพิ่มขึ้น ช่วยบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>6. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย ฉีดพ่นพุ่มใบยางพาราจากใต้ทรงพุ่มอัตรา 100 ลิตร/ไร่ ควรเริ่มพ่นเมื่อยางพาราแตกใบใหม่หลังถูกผลัดใบปกติและใบอยู่ในระยะเพสลาด โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร 6.2 โพรพิแนบ (propineb) หรือ แมโนโคเซบ (mancozeb) หรือ คลอโรทาโนนิล (chlorothalonil) อัตรา 50 กรัม 6.3 เอกแซโคนาโซล (hexaconazole) 5% SC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตร 6.4 โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 10 - 15 มิลลิลิตร
	<p>3. โรคใบร่วง เชื้อสาเหตุ : <i>Phytophthora</i> <i>botryosa</i> Chee หรือ <i>Phytophthora</i> <i>palmivora</i> (Butler)</p>	<p>1. หลีกเลี่ยงการนำกล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดเข้าพื้นที่</p> <p>2. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>3. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>4. บำรุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับภาระของการเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หัว่านหรือใช้เชื้อสตผสมน้ำหรือน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งนี้ ควรห่ว่านหรือฉีดพ่นให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาครอบคลุมบนใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ อาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารและออกซิเจนเพิ่ม ช่วยบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง</p>

พีช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด																								
	<p>4. โรคราแป้ง เชื้อสาเหตุ : <i>Oidium heveae</i> Steinm</p>	<p>1. หมั่นสำรวจสวนยางพารา 2. เขตที่มีการระบาดของโรครุนแรง ไม่ควรปลูกยางพันธุ์อ่อนแอง เช่น PB 235 สถาบันวิจัยยาง 226 การเลือกพันธุ์ยางควรคำนึงถึงลักษณะการผลัดใบพันธุ์ยางที่ผลัดใบเดียวจะหลีกเลี่ยงโรคได้ดีกว่า 3. เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำ เพื่อให้ใบที่ผลิออกมากใหม่ สมบูรณ์และแก่เร็ว พันระยะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อ 4. หากพบการระบาดของโรค ใช้สารเคมีพ่นใบยางอ่อน ดังนี้</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">สารเคมี</th> <th rowspan="2">อัตราการใช้</th> <th rowspan="2">วิธีการใช้</th> </tr> <tr> <th>ชื่อสามัญ</th> <th>% สารออกฤทธิ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เบโนมิล (benomyl)</td> <td>50% WP</td> <td rowspan="2">20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร</td> <td rowspan="2">ฉีดพ่นใบยางอ่อนทุกลับด้าน ในช่วงที่เริ่มพบรอย</td> </tr> <tr> <td>คาร์เบนดาซิม (carbendazim)</td> <td>50% WP</td> </tr> <tr> <td>ซัลเฟอร์ (sulfur)</td> <td>80% WP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ไทริดีมอร์ฟ*</td> <td>75% EC</td> <td>10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร</td> <td></td> </tr> <tr> <td>กำมะถันผง</td> <td></td> <td>1.5-4 กก.ต่อไร่</td> <td>พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอากาศ ประโภชน์จากน้ำค้าง</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ห้ามใช้อัตราสูงกว่าคำแนะนำ เพราะจะทำให้ใบ焉焉ใหม่</p>	สารเคมี		อัตราการใช้	วิธีการใช้	ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์	เบโนมิล (benomyl)	50% WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่นใบยางอ่อนทุกลับด้าน ในช่วงที่เริ่มพบรอย	คาร์เบนดาซิม (carbendazim)	50% WP	ซัลเฟอร์ (sulfur)	80% WP			ไทริดีมอร์ฟ*	75% EC	10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร		กำมะถันผง		1.5-4 กก.ต่อไร่	พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอากาศ ประโภชน์จากน้ำค้าง
สารเคมี		อัตราการใช้	วิธีการใช้																							
ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์																									
เบโนมิล (benomyl)	50% WP	20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร	ฉีดพ่นใบยางอ่อนทุกลับด้าน ในช่วงที่เริ่มพบรอย																							
คาร์เบนดาซิม (carbendazim)	50% WP																									
ซัลเฟอร์ (sulfur)	80% WP																									
ไทริดีมอร์ฟ*	75% EC	10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร																								
กำมะถันผง		1.5-4 กก.ต่อไร่	พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอากาศ ประโภชน์จากน้ำค้าง																							
	<p>5. อาการเปลือกแห้ง/ อาการหน้ายางแห้ง (Tapping panel dryness (TPD))</p>	<p>1. เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางเหล่านั้น ผิดปกติและน้ำยาง الجاري หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยางไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด หันน้ำยางที่แสดงอาการเปลือกแห้งชั่วคราวจะสามารถกรีดได้เป็นปกติอีกหลังจากหยุดกรีดไประยะหนึ่ง ในแปลงปลูกที่เกษตรกรใช้ระบบกรีดถี่ เช่น กรีดทุกวัน สามวันเว้นวัน หรือมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เมื่อตรวจสอบว่า การให้ผลผลิตของต้นยางลดลง ควรปรับระบบกรีดใหม่ เพื่อให้ต้นยางมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการสร้างน้ำยางขึ้นมาทดแทนในแต่ละครั้งกรีด 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ดินปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีอินทรีย์ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของดิน ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น การระบายน้ำของดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบระบายน้ำของพืชสามารถดูดซึมน้ำอาหารได้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน การปลูกพืชคลุมตระกูลถ้วนนอกจากจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์ตั้งแต่ต้นแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน</p>																								

พีช	คัตตุรูปีช	การป้องกันกำจัด
		<p>3. การกรีดยาง</p> <p>3.1 ไม่ควรเปิดกรีดต้นยางขนาดเล็ก หรือต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด การเปิดกรีดต้นยางคราวคำนึงถึงขนาดของต้นยางไม่ใช่อายุของต้นยาง ขนาดของต้นยางแสดงถึงความพร้อมในการให้น้ำยาง การเปิดกรีดต้นยางที่มีขนาดเล็ก จะได้รับผลผลิตน้อย การกรีดหนึ่งในสามลำต้นทุกวันกับต้นขนาดเล็ก ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อครั้งลดลง 30 - 51% และผลผลิตสะสมต่อปีลดลง 6 - 43% นอกจากนี้การกรีดต้นยางขนาดเล็ก ยังมีผลทำให้ต้นยางมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกว่าต้นที่ได้ขนาดเปิดกรีด 12 - 28%</p> <p>3.2 ไม่ควรกรีดยางทุกวัน หรือกรีดติดต่อ กันหลายวัน เพราะแม้ว่าจะได้ผลผลิตสะสมต่อปีสูงเนื่องจากจำนวนวันกรีดมาก แต่ผลผลิตต่อครั้งกรีดต่ำ ปริมาณเนื้อยางแห้งลดลง และจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตรวมในระยะยาว</p> <p>3.3 ควรหยุดกรีดในระยะที่ต้นยางมีการผลลัพธ์ใหม่</p> <p>4. การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง</p> <p>4.1 ส่วนยางที่ใช้สารเคมีเร่งน้ำยางครั้งต้นที่เจริญเติบโตดี ต้นโต เปลือกหนา อุยในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ควรใช้กับต้นยางหนุ่มหรือเพิ่งเปิดกรีด</p> <p>4.2 ควรใช้กับระบบกรีดที่มีวันหยุด ระบบกรีดถ้าไม่เหมาะสมสมต่อการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางพบว่า การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับระบบกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน จะให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดสูงกว่ากรีดวันเว้นวัน 12 - 23% ส่วนการกรีดถี่ โดยกรีดทุกวัน กรีดสองวันเว้นวัน กรีดสามวันเว้นวัน กรีด 4 - 7 วันเว้นวัน ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เพราะต้นยางสูญเสียน้ำยางมาก ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการเปลือกแห้งเพิ่มมากขึ้น</p> <p>4.3 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับพันธุ์ยางกลุ่มที่มีการตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางน้อย ได้แก่ BPM 24, PB 235, สถาบันวิจัยยาง 251 และไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อการเกิดอาการเปลือกแห้งได้ง่าย เช่น BPM 24, PB 235, PB 255, PB 260</p> <p>4.4 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางในช่วงแล้ง ขณะต้นยางเริ่มผลัดใบ และผลลัพธ์ใหม่เนื่องจากสารเคมีเร่งน้ำยางยึดเวลาการให้ผลของน้ำยาง และได้ผลผลิตมากขึ้น ต้นยางมีการสูญเสียน้ำจากลำต้น</p> <p>4.5 ช่วงอากาศหนาวน้ำยางจะเหล่านานกว่าปกติ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง</p> <p>4.6 ความถี่ในการใช้ ในทางปฏิบัติควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2.5% ไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี (3 - 6 ครั้ง) การใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน จะให้ผลตอบแทนสูงในระยะ 3 - 4 ปีแรก หลังจากนั้นต้นยางจะตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางลดลง ที่มา : อารมณ์ ใจนุสุจิตร ศุนย์วิจัยยางสราษฎร์ธานี</p>
4. กาแฟ	หนอนกาแฟสีแดง	<p>1. ทำความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิ่งและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ</p> <p>2. หากพบการเข้าทำลายของหนอนจะใช้กิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลาย nokpalang</p> <p>3. ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงฟานิโตรไฮอ่อน (fenitrothion) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และนำไปทาด้วยแปรงทาสีบริเวณลำต้นกาแฟให้ทั่ว หากใช้ฉีดพ่นให้ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร</p>

ภาคเหนือ

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ เมล็ดดำห่านам และด้วงแรด
- ป่าล้มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนพาราซ่า ด้วงกุหลาบ และโรคทะลายเน่า
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง โรคราแป้ง และอาการเปลี่ยนแห้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ เมล็ดดำห่านам และด้วงแรด
- ป่าล้มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนพาราซ่า ด้วงกุหลาบ และโรคทะลายเน่า
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง โรคเส้นดำ และอาการเปลี่ยนแห้ง

ภาคกลาง และภาคตะวันตก

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ เมล็ดดำห่านам และด้วงแรด
- ป่าล้มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรครากขาว โรคใบร่วง โรคเส้นดำ และอาการเปลี่ยนแห้ง

ภาคตะวันออก


- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ เมล็ดดำห่านам และด้วงแรด
- ป่าล้มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนหน้าเมว ด้วงกุหลาบ และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง และอาการเปลี่ยนแห้ง

ภาคใต้


- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ เมล็ดดำห่านам และด้วงแรด
- ป่าล้มน้ำมัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก หนอนพาราซ่า ด้วงกุหลาบ และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง และอาการเปลี่ยนแห้ง

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้น ปี ๒๕๖๗


ภาพรวมทั่วประเทศ




រាជធានីភ្នំពេញ




ឆ្នាំ ២០១០




ឆ្នាំ ២០១៣




ឆ្នាំ ២០១៤



ឆ្នាំ ២០១៥




ឆ្នាំ ២០១៦




ឆ្នាំ ២០១៧


กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูป่าล้มไม้ มัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗



ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗


กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของคัตตุรยางพารา ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗




ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓



ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูภัยแพ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗



ปี ๒๕๖๖



ปี ๒๕๖๗