



รายงานสถานการณ์ศัตรูไม้ยืนต้น

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โทร. ๐ ๒๘๕๕ ๑๖๒๖ โทรสาร ๐ ๒๘๕๕ ๑๖๒๖

E-mail : doae.pmd2566@gmail.com



สถานการณ์การระบาดศัตรูไม้ยืนต้นที่สำคัญ

ศัตรูไม้ยืนต้น

๑. สถานการณ์การปลูกไม้ยืนต้น

๑.๑ พื้นที่ปลูกมะพร้าว	ทั้งหมด ๖๓ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๑,๐๔๔,๕๕๔.๖๒ ไร่
๑.๒ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน	ทั้งหมด ๖๗ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๕,๑๐๔,๙๔๓.๓๘ ไร่
๑.๓ พื้นที่ปลูกยางพารา	ทั้งหมด ๖๗ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๑๗,๘๔๖,๗๐๐.๒๐ ไร่
๑.๔ พื้นที่ปลูกกาแฟ	ทั้งหมด ๖๐ จังหวัด	รวมพื้นที่ยืนต้น ๙๔,๔๗๐.๔๗ ไร่

๒. สถานการณ์การระบาดของศัตรูไม้ยืนต้นที่สำคัญ

๒.๑ ศัตรูมะพร้าว

๒.๑.๑ หนอนหัวดำ พื้นที่ระบาด ๒๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ตราด สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สตูล ปัตตานี ภูเก็ต ยะลา พังงา จันทบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ยะลา สุรินทร์ ชัยภูมิ ระยอง ราชบุรี เพชรบูรณ์ และจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๔๓,๒๒๐.๔๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๑๙๓.๓๘ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๔๓,๐๒๗.๐๕ ไร่) แบ่งเป็น

- (๑) การทำลายระดับน้อย จำนวน ๙,๓๑๙.๓๐ ไร่ (๒๑.๕๔ %)
- (๒) การทำลายระดับปานกลาง จำนวน ๒๗,๓๐๐.๖๐ ไร่ (๖๓.๑๗ %)
- (๓) การทำลายระดับรุนแรง จำนวน ๖,๖๑๐.๔๓ ไร่ (๑๕.๒๙ %)

๒.๑.๒ แมลงดำนาม พื้นที่ระบาด ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี สตูล สงขลา ตราด ยะลา พังงา ภูเก็ต ตรัง สมุทรสงคราม จันทบุรี สมุทรสาคร ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ ยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๑๒,๗๔๗.๐๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๘๑.๖๑ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๑๒,๗๐๕.๔๐ ไร่) แบ่งเป็น

- (๑) การทำลายระดับน้อย จำนวน ๕,๘๘๕.๔๖ ไร่ (๔๖.๑๑ %)
- (๒) การทำลายระดับปานกลาง จำนวน ๖,๒๖๙.๕๕ ไร่ (๔๙.๐๓ %)
- (๓) การทำลายระดับรุนแรง จำนวน ๖๒๗.๐๐ ไร่ (๔.๘๖ %)

๒.๑.๓ ตัวงเรด พื้นที่ระบาด ๒๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ชุมพร ตราด สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช สตูล สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ยะลา สงขลา จันทบุรี กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สมุทรปราการ พังงา นครปฐม ระยอง นครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวน ๖,๑๘๖.๔๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น ๕๕๑.๐๘ ไร่ (สัดดาวที่ผ่านมา ๕,๖๓๔.๓๙ ไร่)

๒.๑.๔ ตัวงวง พื้นที่ระบบ ๓๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครศรีธรรมราช พัทฯ เพชรบุรี ระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน ๑,๒๑๐.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๔.๗๕ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๒๑๕.๒๕ ไร่)

๒.๑.๕ ไรสีเขามะพร้าว พื้นที่ระบบ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม สระแก้ว บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร ตราด และจังหวัดซัยภูมิ รวมจำนวน ๓๓๙.๘๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๙๙.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔๒๔.๘๐ ไร่)

๒.๒ ศัตรูป่ามีน้ำมัน

๒.๒.๑ หนองปลอกเล็ก พื้นที่ระบบ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะรัง และจังหวัดชลบุรี รวมจำนวน ๗๓๒.๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๑๖.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๗๔๙.๕๓ ไร่)

๒.๒.๒ ตัวงแรด พื้นที่ระบบ ๓๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สตูล สุราษฎร์ธานี ยะรัง นครศรีธรรมราช ตราด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตรัง พังงา จันทบุรี และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๑,๒๔๙.๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๒๕.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑,๒๗๔.๙๐ ไร่)

๒.๒.๓ ตัวงกุหลาบ พื้นที่ระบบ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ยะรัง ชลบุรี สงขลา สตูล ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส จันทบุรี และจังหวัดพังงา รวมจำนวน ๗๔๐.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบเพิ่มขึ้น ๑๔.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๗๒๖.๐๐ ไร่)

๒.๒.๔ โรคลำต้นเน่า พื้นที่ระบบ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง ระยอง สงขลา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ตราด และจังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน ๑๑,๔๑๒.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๑๒๙.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๑,๕๔๑.๐๐ ไร่)

๒.๒.๕ โรคทะลายเน่า พื้นที่ระบบ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตราด ชุมพร สงขลา นราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน ๑๖๖.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๓ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๐.๕๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๖๖.๕๐ ไร่)

๒.๒.๖ โรคใบจุด พื้นที่ระบบ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี ระยอง นครศรีธรรมราช และจังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน ๙๖.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๒ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบคงที่

๒.๒.๗ โรคใบจุดสาหร่าย พื้นที่ระบบ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะรัง ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวน ๔๐๑.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๒.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔๐๓.๐๐ ไร่)

๒.๓ ศัตรูยางพารา

๒.๓.๑ โรครากรขาว พื้นที่ระบบ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร ปัตตานี ยะรัง และจังหวัดตราด รวมจำนวน ๒,๐๔๙.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบคงที่

๒.๓.๒ โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พื้นที่ระบบ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา ปัตตานี ยะลา สุไห์ทัย พังงา หนองคาย น่าน ยะรัง และจังหวัดแพร่ รวมจำนวน ๑๓๑,๔๕๕.๙๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๔ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบคงที่

๒.๓.๓ โรคใบร่วง พื้นที่ระบบ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สุราษฎร์ธานี พังงา น่าน ตราด ชุมพร หนองคาย ยะรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และจังหวัดตรัง รวมจำนวน ๓,๘๒๘.๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๑๑.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๓,๘๓๙.๕๐ ไร่)

๒.๓.๔ อาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ายางแห้ง พบรากระบบ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล จำนวน ๔,๗๒๒.๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓ ของพื้นที่ป่าลูก พื้นที่ระบบลดลง ๒.๐๐ ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ๔,๗๒๔.๖๕ ไร่)

๒.๔ ศัตรูกาแฟ

๒.๔.๑ หนอนกาแฟสีแดง พบรากระบัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบัดคงที่

๒.๔.๒ โรคราสนิม พบรากระบัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกรุงปี จำนวน ๘.๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของพื้นที่ปลูก พื้นที่ระบัดคงที่

๓. การดำเนินงานในพื้นที่ระบัด

๓.๑ การควบคุมศัตรูแมลงพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่พบรากระบัดและปราภูร่องรอย การเข้าทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว ได้สาธิติวิธีการผลิต ขยายแต่นเปียนบราคอน (*Bracon hebetor*) ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแต่นเปียนบราคอน (*Bracon hebetor*) เพื่อควบคุมการระบัดของหนอนหัวดำในพื้นที่ ส่งเสริมให้ผลิตขยาย และปล่อยแต่นเปียนบราคอน (*Asecodes hispinarum*) เพื่อควบคุมหนอนของแมลงดำนามมะพร้าว ส่งเสริมให้ผลิต ขยาย และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และปล่อยแต่นเปียนเตตระสติกัส (*Tetrastichus brontispae*) เพื่อควบคุมดักแด้ของแมลงดำนามมะพร้าวในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนแต่นเปียนบราคอน แต่นเปียนบราคอน และแต่นเปียนเตตระสติกัส จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษษาพืช (ศทอ.) และใช้สารเคมีในพื้นที่ที่พบรากระบัดรุนแรง โดยใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจ ผู้ระหว่าง ติดตามสถานการณ์การระบัดอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เกษตรกรตัดทางใบมะพร้าว ที่ถูกแมลงศัตรูแมลงพืชไปทำลาย nokaplong เพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ และได้จัดทำข่าวเตือนการระบัดศัตรูพืช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line facebookfanpage สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูแมลงพืช

๓.๒ การควบคุมศัตรูป่าล้มน้ำมัน

สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ที่พบรากระบัดของโรคและปราภูร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูป่าล้มน้ำมัน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มนหอนฝีเสื้อ และกลุ่มด้วงปีกแข็ง ได้สาธิติวิธีการผลิต ขยาย เชื้อรากเมตตาไรเชียม (*Metarhizium anisopliae*) ให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ผลิต ขยาย และใช้เชื้อรากเมตตาไรเชียม (*Metarhizium anisopliae*) เพื่อควบคุมการทำลายของด้วงแรด ด้วงงวง และด้วงกุหลาบในระยะดักแด้ และระยะตัวหนอนในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต ขยาย ใช้เชื้อรากโดยรีโนไม่ป่าล้มน้ำมันที่เกิดโรคลำต้นเน่า เมื่อพบดอกเหตุเดริญเติบโตขึ้นที่บริเวณโคนลำต้นป่าล้มน้ำมัน ให้รับกำจัด และหากบริเวณที่เนื้อเยื่อถูกทำลายออก ทบทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อราก เช่น thairiram และใช้เชื้อรากโดยรีโนมาเรคิดพั่นบริเวณรอบโคนต้นและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ โดยผสมเชื้อสอด ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ - ๑๐๐ ลิตร กรองเฉพาะน้ำนำมاءใช้ เพื่อควบคุมการระบัดไม่ให้ลุกลามไปยังต้นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยขอรับการสนับสนุนเชื้อรากเมตตาไรเชียม และเชื้อรากโดยรีโนมาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษษาพืช (ศทอ.) และได้จัดทำข่าวเตือนการระบัดศัตรูพืช เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น line facebookfanpage

๓.๓ การควบคุมศัตรูധารา

๓.๓.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดที่พบรากระบัดของโรคราษฎรധารา แนะนำเกษตรกรให้ใช้วิธีการป้องกันกำจัดโรคราษฎรധารา โดยต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป ควรขุดคูกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบ ในแ Kawadeiyakan ข้างละ ๒ ต้น และกีงคลางระหว่างແຕวข้างเคียงของแ Kawadeiyakan ที่พบรากกับแ Kawadeiyakan ไปทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการลุกลามทางราษฎร และควรขุดลอกคูทุกปี

๓.๓.๒ สำนักงานเกษตรจังหวัดที่พบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา แนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการควบคุมการระบาดของโรค และแนะนำให้ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางพาราให้แข็งแรง พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคบริร่วงชนิดใหม่ของยางพาราให้กับเกษตรกรในพื้นที่

๓.๓.๓ ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดใบยางพาราที่เกิดโรคหรือวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค และบำรุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ให้เหมาะสมกับระยะเวลาเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย

๓.๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรคบริร่วงชนิดใหม่ของยางพารา พันธุ์ต้านทานปานกลาง ได้แก่ PB ๒๓๕, RRIT ๒๒๖ และ BPM ๑

๓.๓.๕ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคราแป้งในยางพาราอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคตามคำแนะนำของภาระยางแห่งประเทศไทย และจัดทำข่าวเตือนการระบาด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้

๓.๔ การควบคุมศัตรูกาแฟ

๓.๔.๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้และให้คำแนะนำเกษตรให้ดูแลสวนกาแฟให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่งกิ่งกาแฟให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึง และเก็บเศษชาփี้ออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรค พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นกาแฟให้สมบูรณ์แข็งแรง

๓.๔.๒ ทำข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูกาแฟที่พบในกาแฟ ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น line facebook เป็นต้น

๓.๔.๓ รณรงค์ให้เกษตรกรสำรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๔. คำแนะนำและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่พบการระบาด

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
1. ศัตรูมะพร้าว	1. หนอนหัวดำมะพร้าว 2. แมลงดำหนามะพร้าว	<ol style="list-style-type: none"> ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวไปเผาทำลายทิ้งออกแปลง เก็บเศษชากรังไข่นอกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ ปล่อยแตนเบียนบรากอน (<i>Bracon hebetor</i>) เพื่อควบคุมระยะหนอนของหนอนหัวดำ อัตราเริ่ม 200 ตัว กระจายทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา (<i>Trichogramma sp.</i>) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตราเริ่ม 10 แผ่นๆ ละ 2,000 ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 15 วัน ใช้สารเคมีอีมาเม็กติน เบโนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92% EC ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 5.1 มะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ฉีดเข้าลำต้น อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยเจาะลำต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ใช้ดอกสว่านขนาด 4 - 5 หุน เอียงลง 45 องศา เจาะลึก 10 เซนติเมตร เจาะ 2 รู ให้รูอยู่ตรงกันข้ามกัน ใส่สารรูละ 15 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ดินน้ำมันอุดรูทันที วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอนได้นานมากกว่า 3 เดือน 5.2 มะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำนาตalaให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ฟลูเบนไดโอล์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม - คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร - สปินโน飒ด (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร - ลูเฟนูرون (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร <p>***โดยพ่นให้ทั่วทั้งพืช จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน หากมีการปล่อยแตนเบียนให้ปล่อยหลังพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์</p>
	2. แมลงดำหนามะพร้าว	<ol style="list-style-type: none"> ตัดยอดมะพร้าวที่ถูกหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามกัดกิน ไปเผาทำลาย ปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (<i>Asecodes hipinarum</i>) อัตรา 5 - 10 มมม./ไร่ ปล่อย 3 - 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 - 10 วัน เพื่อควบคุมหนอนแมลงดำหนามมะพร้าว ปล่อยแตนเบียนเตトラสติกัส (<i>Tetrastichus brontispa</i>) อัตรา 5 - 10 มมม./ไร่ โดยปล่อยทุก ๆ 7 วัน ต่อเนื่อง 1 เดือน ควบคุมตักเต้แมลงดำหนามมะพร้าว อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงทางหนึ่ง

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	3. ด้วงแรด	<ol style="list-style-type: none"> ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้ตาข่ายหรือเหล็กป่า มาซึ่งชาวทิศทางลมในระดับต้นปาร์มสูง ดักจับด้วงแรด ในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามาตตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) อัตรา 800 กรัม ต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและดักแด้ หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ - ไดอะซินอน (diazinon) 60% EC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบริเวณ คอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้ปียก โดยใช้ปริมาณ 1 - 1.5 ลิตรต่อต้น ทุก 15 - 20 วัน ควรใช้ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงระบบ
	4. ด้วงวง	<ol style="list-style-type: none"> ใช้ตาข่ายดักจับด้วงวงในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรามาตตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) เพื่อกำจัดด้วงวง ในระยะหนอนและดักแด้ ใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง ทาบริเวณแผลโคนต้น หรือลำต้นมะพร้าว เพื่อป้องกันการวางไข่ของด้วงวงมะพร้าว ป้องกันละกำจัดด้วงแรดมะพร้าวย่าให้ระบบในสวนมะพร้าวรายแผล ที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงวงมะพร้าววางไข่และเมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนแล้วตัวหนอนของด้วงวงมะพร้าวจะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น
	5. ไรสีขามะพร้าว	<ol style="list-style-type: none"> ตัดทะลายและชุดอกมะพร้าวที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง ไรสีขามะพร้าวจะเข้าทำลายอยู่ภายใต้ผลมะพร้าวทำให้การพ่นสารฆ่าไร ไม่สามารถโดนตัวได้โดยตรง ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในระยะมะพร้าวติดจันจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสีขามะพร้าวเข้าทำลาย ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้สลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์ในการพ่นทุก 2 ครั้ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 2.1 โพรพาไกต์ (propargite) 30% WP (สารกลุ่ม 12) อัตรา 30 กรัม 2.2 อะมิทรัซ (amitraz) 20% EC (สารกลุ่ม 19) อัตรา 40 มิลลิลิตร 2.3 กำมะถังพง* 80% WP (สารกลุ่ม UN) อัตรา 60 กรัม 2.4 ไพริดาเบน (pyridazinone) 20% WP (สารกลุ่ม 21) อัตรา 10 กรัม 2.5 สไปромีซิเฟน (spiromesifen) 24% SC (สารกลุ่ม 23) อัตรา 6 มิลลิลิตร 2.6 เอกซีโทอะซอกส์ 1.8% (สารกลุ่ม 10) อัตรา 30 มิลลิลิตร 2.7 ไฮฟลูมิโทเฟน (hexythiazox) 20% SC (สารกลุ่ม 25) อัตรา 10 มิลลิลิตร 2.8 ทีบูเฟนไพรแรด (tebufenpyrad) 36% EC (สารกลุ่ม 21) อัตรา 3 มิลลิลิตร <p>* สารกำมะถังพงห้ามผสมกับสารชนิดอื่นเพราะอาจเกิดพิษกับมะพร้าวได้</p>
	6. หนอนกินใบมะพร้าว	<ol style="list-style-type: none"> ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนกินใบมะพร้าวทำลาย นำออกไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง นำไปเผาทำลายทันที เก็บเศษจากพืชนำออกไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ หมั่นสำรวจสวนมะพร้าวย่างสม่ำเสมอ

พช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
2. ปาล์มน้ำมัน	1. หนอนปลอกเล็ก	<p>1. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ถูกหนอนปลอกเล็กกัดกินมาเพาทำลายทิ้ง แต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบการระบาดของด้วงวงหรือด้วงสาคูไม่ควรตัดทางใบ เพราะรอยแผลจะเป็นช่องทางเข้าทำลายของด้วงวง</p> <p>2. พ่นเชื้อปีที (<i>Bacillus thuringiensis</i>) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 5 มิลลิลิตร พ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและต้องพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวีที่จะทำลายเชื้อปีที โดยใช้เครื่องพ่นที่ปรับความดันได้ไม่น้อยกว่า 30 บาร์ และพ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ห่างกัน 5 - 7 วัน</p> <p>3. กรณีพบการระบาดของหนอนปลอกเล็กระดับรุนแรง ให้เลือกใช้สารเคมีชนิดไดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทางใบของปาล์มน้ำมัน ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <p>3.1 ฟลูเบนไดเอไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม</p> <p>3.2 คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.3 สปินโนแสด (spinosad) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.4 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อ กุ้ง</p>
	2. ด้วงแรด	<p>1. ใช้กับดักฟีโรโมนล่อด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>2. ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทำลาย</p> <p>3. ทำกองล่อโดยใช้เชื้อรากเมตตาไรเซียม (<i>Metarhizium anisopliae</i>) อัตรา 800 กรัมต่อกองล่อ ผสมกับปุ๋ยคอกและมะพร้าวสับ อัตราส่วน 0.5 : 1 เพื่อกำจัดด้วงแรดในระยะหนอนและดักแด้</p>
	3. ด้วงกุหลาบ	<p>1. หม่นทำความสะอาดบริเวณคอปาล์มน้ำมัน และบริเวณโคนทางใบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ใช้สารฆ่าแมลงประเภท Carbaryl เช่น เชฟวิน (Sevin) 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ทุก 7 - 10 วัน ในตอนเย็นก่อนค่ำ</p>
	4. หนอนหน้าแมว	<p>แนวทางป้องกัน/แก้ไข</p> <p>1. การใช้วิธีกล</p> <p>1.1 ตัดใบย่อยที่มีหนอนหน้าแมว หรือจับผีเสื้อ ชี้งเกะนิ่งในเวลากลางวันตามไฟทางใบปาล์มน้ำมัน หรือเก็บดักเด็ดตามใบ และซอกโคนทางใบรอบต้นมาทำลาย</p> <p>1.2 ใช้กับดักแสงไฟ โดยใช้แสงไฟ black light หรือ หลอดนีออนธรรมดาวางบนกะละมังพลาสติก ซึ่งบรรจุน้ำผสมผงซักฟอก ให้หลอดไฟอยู่เหนือน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตร วางล่อผีเสื้อช่วงเวลา 18.00-19.00 น. ชี้งสามารถช่วยกำจัดการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปได้</p> <p>2. การใช้วิธีรีบด์</p> <p>พ่นแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส <i>Bacillus thuringiensis</i> อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ซึ่งเข้าแบคทีเรียนี้สามารถทำลายกลุ่มหนอนผีเสื้อทำลายปาล์มน้ำมัน และไม่เป็นอันตรายต่อมวลที่มีประโยชน์</p>

พืช	ศัตรุพืช	การป้องกันกำจัด
		<p>3. การใช้สารเคมี</p> <p>เริ่มพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายบริเวณผิวใบ เฉลี่ย 20 ตัวต่อ ทางใบ ให้เลือกใช้สารเคมีชนิดไดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทางใบของปาล์มน้ำมัน ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้</p> <p>3.1 เดลทาเมทริน (deltamethrin) 3% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.2 อีโทเฟนพร็อกซ์ (etofenprox) 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>3.3 ฟลูเบนไดเอไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 5 กรัม</p> <p>3.4 คลอรานทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.5 ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตร</p> <p>3.6 ลูเฟนนูรอน (lufenuron) 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.7 อิมาเม็กติน บ,enzoate (emamectin benzoate) 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร</p> <p>3.8 คาร์บาริล (carbaryl) 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 10 กรัม</p> <p>3.9 แลมบ์ดา-ไซยาโลทริน (lambda-cyhalothrin) 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร</p> <p>***ควรระมัดระวังการใช้สารลูเฟนนูรอน ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำเนื่องจากมีพิษสูงต่อ กุ้ง</p> <p>4. การใช้วิธีผสมผสาน</p> <p>4.1 การใช้กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อในช่วงที่ดักแด้กำลังออกเป็นผีเสื้อ ลับกับการใช้ สารฆ่าแมลงหรือเชือ่แบคทีเรีย ในช่วงเป็นหนอนร้ายเล็ก</p> <p>4.2 การใช้เชือ่แบคทีเรียลับกับการใช้สารฆ่าแมลง</p>
5. โรคลำต้นเน่า เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา <i>Ganoderma</i> sp.		<p>1. กำจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่น ๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อในธรรมชาติ</p> <p>2. สำรวจสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบดอกเหตุเดิบโขลงบริเวณลำต้น ให้รีบกำจัด โดยนำไปทำลายทิ้ง nokok แปลงทันที และถากบริเวณที่เนื้อยื่นที่ถูกทำลายออก ทบทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น thairam และค่อยตรวจสอบหากพบว่ามีดอกเหตุเกิดขึ้น อีกหรือลักษณะอาการทางใบยังไม่ปกติจะต้องทำการถากซ้ำ แล้วทบทับด้วยสารเคมีกำจัดเชื้อรา</p> <p>3. บำรุงต้นปาล์มน้ำมันให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัม รำละเอียด 4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 - 100 กิโลกรัม ห่ว่านรอบทรงพุ่ม 3 - 6 กิโลกรัมต่อต้นในช่วงที่มีความชื้นสูงหรือรองกันกันหลุมก่อน ปลูก 100 กิโลกรัมต่อหลุม</p> <p>4. -rad หรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา โดยผสมเชื้อสต 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 - 100 ลิตรกรองเฉพาะน้ำนำมาใช้</p>
6. โรคทะลายเน่า เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา <i>Marasmius palmivorus</i>		<p>1. ตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน ช่อดอกที่ฟ่อ และทะลายที่พับเป็นโรค นำออกไป เผาทำลายทิ้ง nokok แปลง</p> <p>2. ทำความสะอาดสวน และกำจัดวัชพืช เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น</p>

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	7. โรคใบจุด เชื้อสาเหตุ : เชื้อร้า <i>Curvularia</i> ssp., <i>Helminthosporium</i> sp. และ <i>Pestalotiopsis</i> sp.	1. กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสวนปาล์มน้ำมันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 2. แยกต้นกล้าที่เป็นโรคใบจุดออกจากแปลง ตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที 3. เมื่อพบการระบาด ให้ลดการใช้ปุ๋ยในโตรเจน และตัดแต่งใบที่เป็นโรคใบจุด นำออกไปเผาทำลายทันที
	8. โรคใบจุดสาหร่าย เชื้อสาเหตุ : <i>Phycopeltis</i> sp.	1. สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสับดาห์หลังรั้ง 2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคใบจุดสาหร่าย นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ร์ไปยังต้นอื่น ๆ 3. หากทางใบปาล์มน้ำมันแห้งมากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมผ่าน เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม 4. หากพบการระบาดรุนแรง แนะนำให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้สารเคมี คوبเปอร์ออกซิคลอไรด์ (copper oxychloride) 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่แผ่นใบ
	9. โรคก้านทางใบเน่า	1. สำรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคก้านทางใบเน่าในช่วงฤดูฝน โดยสำรวจสับดาห์หลังรั้ง 2. ตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคก้านทางใบเน่า นำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ของสปอร์ร์ไปยังต้นอื่น ๆ 3. หากทางใบปาล์มน้ำมันแห้งมากไป พยายามตัดแต่งทางใบแห้งออก เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีลมผ่าน เพื่อลดความชื้นในทรงพุ่ม

พีช	คัตตูปีช	การป้องกันกำจัด
3. ยางพารา	1. โรครากรขาว เชื้อสาเหตุ : เชื้อร่า <i>Rigidoporus microporus</i> (Sw.) Overeem	<p>การปฏิบัติก่อนการปลูก</p> <p>1. ตรวจสอบก่อนโคนว่ามีต้นยางพารากลุ่มใดบ้างที่เป็นโรค และทำเครื่องหมายเพื่อเป็นพื้นที่เฝ้าระวังหลังปลูก</p> <p>2. การเตรียมดินควรทำลายตอไม้ ห่อนไม้เก่า และเศษรากเก่าออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นโรคควรเผาทำลายให้หมด จากนั้นได้ผลิกหน้าดินตากแดดเพื่อกำจัดเชื้อร่าที่เจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็ก ๆ ที่หลงเหลืออยู่ในดิน</p> <p>3. ในแปลงยางพาราปลูกแทนที่เคยเป็นโรคทางระบบ根本 ควรเตรียมพื้นที่ปล่อยว่างไว้ 1 - 2 ปี ปลูกพืชคุณภาพดี หรือพืชไร่อายุสั้น เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสม กับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลทรรศน์ในดินและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ช่วยย่อยสลายเศษรากซึ่งเป็นแหล่งอาหารของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>การปฏิบัติระหว่างปลูก</p> <p>1. การวางแผนในการปลูกแทน ควรเปลี่ยนจุดที่เจาะหลุมปลูกให้อยู่ระหว่างเดิม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรครากรขาว</p> <p>2. แปลงที่มีประวัติการเป็นโรครากรามาก่อน ควรใช้กำมะถันผงผสมดินในหลุมปลูก 100 - 200 กรัมต่อหลุม และทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายรากยางพารา</p> <p>3. แปลงที่ปลูกพืชคุณภาพดี ควรปลูกให้ห่างจากแต่ละต้นยางพาราประมาณ 1.50 เมตร</p> <p>การปฏิบัติหลังปลูก</p> <p>1. ควรสำรวจต้นยางพาราสำหรับต้นที่ปลูกในบริเวณที่เคยเป็นโรครากรขาว หากพบต้นยางพาราแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ ควรขุดดูโคนต้น และราก หากพบเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคให้ขุดเผาทำลายเพื่อยับยั้งการระบาดของโรค</p> <p>2. ต้นยางพาราที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ควรขุดคุกกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร จำกัดบริเวณที่เป็นโรค โดยขุดระหว่างต้นที่อยู่ถัดไปจากต้นที่แสดงอาการทางใบในเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึงกลางระหว่างแควข้างคียงของแควยางพาราที่พับโรค กับแควถัดไปทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันการลุก浪ทางราก และควรขุดลอกคุกทุกปี</p> <p>3. ใช้สารเคมีสำหรับรักษาต้นที่เป็นโรค และต้นข้างเคียงเพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยขุดร่องรอบโคนต้นกว้าง 15 - 20 เซนติเมตร เทสารเคมีที่ผสมน้ำลงในร่องรอบโคนต้น 1 - 4 ลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดโคนต้น ใช้สารเคมีทุก 6 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 1 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 ไตรดีเมอร์ฟ (tridemorph) 75% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.2 ไซโพรโคงาโซล (cyproconazole) 10% SL อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.3 โปรปิโคงาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตร 3.4 マイクロบิวทานิล (myclobutanil) 12.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.5 เฮกซาโคงาโซล (hexaconazole) 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.6 ไดฟีโนโคงาโซล (difenoconazole) 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 3.7 เฟนิโคลนิล (phenylephrine) 40% FS อัตรา 1.5 - 3 กรัม 3.8 โพรคลอร่าซ (prochloraz) 45% EC อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตร

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
	<p>2. โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา เชื้อสาเหตุ : <i>Pestalotiopsis</i> sp. หรือ <i>Colletotrichum</i> sp.</p>	<p>1. หลีกเลี่ยงการนำกล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดเข้าพื้นที่</p> <p>2. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>3. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>4. บำรุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ไส้ให้เหมาะสมกับระยะเวลาเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสต 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หวานหรือใช้เชื้อสตผสมน้ำหรือน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ อาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารและออกซิเจนเพิ่ช ช่วยบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>6. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย ฉีดพ่นพุ่มใบยางพาราจากใต้ทรงพุ่มอัตรา 100 ลิตร/ไร่ ควรเริ่มพ่นเมื่อยางพาราแตกใบใหม่หลังถูกกลผลัดใบปกติและใบอยู่ในระยะเพสลาต โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) + โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร 6.2 โพรพิแนบ (propineb) หรือ แมนโคเซบ (mancozeb) หรือ คลอโรทาโนนิล (chlorothalonil) อัตรา 50 กรัม 6.3 เอกแซโคนาโซล (hexaconazole) 5% SC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตร 6.4 โพรพิโคนาโซล (propiconazole) 25% EC อัตรา 10 - 15 มิลลิลิตร
	<p>3. โรคใบร่วง เชื้อสาเหตุ : <i>Phytophthora</i> <i>botryosa</i> Chee หรือ <i>Phytophthora</i> <i>palmivora</i> (Butler)</p>	<p>1. หลีกเลี่ยงการนำกล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดเข้าพื้นที่</p> <p>2. ทำความสะอาดสวนยางพาราอย่างสม่ำเสมอ กำจัดใบยางพาราที่เกิดโรค และกำจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมหรือพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค</p> <p>3. ใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>4. บำรุงต้นยางพาราและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้ต้นยางพารา เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และใส่ไส้ให้เหมาะสมกับระยะเวลาเจริญเติบโตของยางพาราตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย</p> <p>5. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อกำจัดและควบคุมเชื้อราสาเหตุที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนใบยางพาราที่ร่วงหล่นบริเวณพื้น โดยใช้อัตรา เชื้อสต 1 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 3 เดือน เช่น ใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัม หวานหรือใช้เชื้อสตผสมน้ำหรือน้ำสมน้ำหมักชีวภาพ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งสวน ซึ่งการใช้เชื้อสตผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือผสมน้ำหมักชีวภาพ อาจทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ต้นยางพาราจะได้รับธาตุอาหารและออกซิเจนเพิ่ช ช่วยบำรุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง</p>

พืช	ศัตรูพืช	การป้องกันกำจัด
-----	----------	-----------------

<p>4. โรคราแป้ง เชื้อสาเหตุ : <i>Oidium heveae</i> Steinm</p>	<p>1. หมั่นสำรวจสวนยางพารา 2. เขตที่มีการระบาดของโรครุนแรง ไม่ควรปลูกยางพันธุ์อ่อนแอง เช่น PB 235 สถาบันวิจัยยาง 226 การเลือกพันธุ์ยางควรคำนึงถึงลักษณะการผลัดใบพันธุ์ยางที่ผลัดใบเดียวจะหลักเลี้ยงโรคได้ดีกว่า 3. เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงปลายฤดูฝนตามคำแนะนำ เพื่อให้ใบที่ผลิออกมากใหม่ สมบูรณ์และแก่เร็ว พันระยะอ่อนแองแต่ต่อการเข้าทำลายของเชื้อ 4. หากพบการระบาดของโรค ใช้สารเคมีพ่นใบยางอ่อน ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="616 534 1399 1080"> <thead> <tr> <th colspan="2">สารเคมี</th><th rowspan="4">อัตราการใช้</th><th rowspan="4">วิธีการใช้</th></tr> <tr> <th>ชื่อสามัญ</th><th>% สารออกฤทธิ์</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เบโนมิล (benomyl)</td><td>50% WP</td></tr> <tr> <td>คาร์เบนดาซิม (carbendazim)</td><td>50% WP</td></tr> <tr> <td>ซัลเฟอร์ (sulfur)</td><td>80% WP</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ไ崔ดีเมอร์ฟ* (tridemorph)</td><td>75% EC</td><td>10 มีลี ต่อน้ำ 20 ลิตร</td><td></td></tr> <tr> <td>กำมะถันผง</td><td></td><td>1.5-4 กก.ต่อไร่</td><td>พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอากาศ ประโcyน์จากน้ำค้าง</td></tr> </tbody> </table> <p>* ห้ามใช้อัตราสูงกว่าคำแนะนำ เพราะจะทำให้ใบยางไหม้</p>	สารเคมี		อัตราการใช้	วิธีการใช้	ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์	เบโนมิล (benomyl)	50% WP	คาร์เบนดาซิม (carbendazim)	50% WP	ซัลเฟอร์ (sulfur)	80% WP			ไ崔ดีเมอร์ฟ* (tridemorph)	75% EC	10 มีลี ต่อน้ำ 20 ลิตร		กำมะถันผง		1.5-4 กก.ต่อไร่	พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอากาศ ประโcyน์จากน้ำค้าง
สารเคมี		อัตราการใช้	วิธีการใช้																				
ชื่อสามัญ	% สารออกฤทธิ์																						
เบโนมิล (benomyl)	50% WP																						
คาร์เบนดาซิม (carbendazim)	50% WP																						
ซัลเฟอร์ (sulfur)	80% WP																						
ไ崔ดีเมอร์ฟ* (tridemorph)	75% EC	10 มีลี ต่อน้ำ 20 ลิตร																					
กำมะถันผง		1.5-4 กก.ต่อไร่	พ่นใบยางอ่อนในช่วงเช้าตรู่ เพื่อหลีกเลี่ยงลม และอากาศ ประโcyน์จากน้ำค้าง																				
<p>5. อาการเปลือกแห้ง/ อาการหน้ายางแห้ง (Tapping panel dryness (TPD))</p>	<p>1. เมื่อสังเกตพบความผิดปกติในการให้น้ำยางของต้นยาง เช่น ต้นยางให้เล่นน้ำ ผิดปกติและน้ำยางຈາງลง หรือน้ำยางหยุดไหลเร็ว หรือน้ำยางหยุดไหลเป็นช่วง ๆ บนหน้ากรีด ควรหยุดกรีด 3 - 6 เดือน แล้วบำรุงใส่ปุ๋ยต้นยาง หรือจนกระทั่งน้ำยาง ให้ไหลเป็นปกติเมื่อทำการทดสอบกรีด หั่นต้นยางที่แสดงอาการเปลือกแห้งชั่วคราวจะสามารถกรีดได้เป็นปกติอีกหลังจากหยุดกรีดไประยะเวลาหนึ่ง ในแปลงปลูกที่เกษตรกรใช้ระบบกรีดถี่ เช่น กรีดทุกวัน สามวันเว้นวัน หรือมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เมื่อตรวจพบว่า การให้ผลผลิตของต้นยางลดลง ควรปรับระบบกรีดใหม่ เพื่อให้ต้นยางมีระยะเวลาเพียงพอสำหรับการสร้างน้ำยางขึ้นมาทดแทนในแต่ละครั้งกรีด 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ดินปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีอินทรีย์ต่ำในดินอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเนียงเหนือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสด มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของดิน ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น การระบายน้ำอากาศของดินเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบระบายน้ำสามารถดูดราชุดอาหารได้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน การปลูกพืชคลุมตราชุดถาวรจากจะเป็นการเพิ่มอินทรีย์ต่ำให้แก่ดินแล้ว ยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มราชุดอาหาร โดยเฉพาะราชุดในโตรเจน</p>																						

พีช	ศัตรุพีช	การป้องกันกำจัด
		<p>3. การกรีดยา</p> <p>3.1 ไม่ควรเปิดกรีดต้นยางขนาดเล็ก หรือต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด การเปิดกรีดต้นยางควรคำนึงถึงขนาดของต้นยางไม่ใช่อายุของต้นยาง ขนาดของต้นยางแสดงถึงความพร้อมในการให้น้ำยาง การเปิดกรีดต้นยางที่มีขนาดเล็ก จะได้รับผลผลิตน้อย การกรีดหนึ่งในสามลำต้นทุกวันกับต้นขนาดเล็ก ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อครั้งลดลง 30 - 51% และผลผลิตสะสมต่อปีลดลง 6 - 43% นอกจากนี้การกรีดต้นยางขนาดเล็กยังมีผลทำให้ต้นยางมีอัตราการเจริญเติบโตต่างกันที่ได้ขนาดเปิดกรีด 12 - 28%</p> <p>3.2 ไม่ควรกรีดยางทุกวัน หรือกรีดติดต่อ กันหลายวัน เพราะแม้ว่าจะได้ผลผลิตสะสมต่อปีสูงเนื่องจากจำนวนวันกรีดมาก แต่ผลผลิตต่อครั้งกรีดต่ำ ปริมาณเนื้อยางแห้งลดลง และจำนวนต้นยางแสดงอาการเปลี่ยนแห้งสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตรวมในระยะยาว</p> <p>3.3 ควรหยุดกรีดในระยะที่ต้นยางมีการผลิใบใหม่</p> <p>4. การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง</p> <p>4.1 ส่วนยางที่ใช้สารเคมีเร่งน้ำยางความมีต้นยางที่เจริญเติบโตดี ต้นโต เปลือกหนาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ควรใช้กับต้นยางหนุ่มหรือเพิ่งเปิดกรีด</p> <p>4.2 ควรใช้กับระบบกรีดที่มีวันหยุด ระบบกรีดถ้าไม่เหมาะสมสมต่อการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางพบว่า การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับระบบกรีดครึ่งลำต้นวันวันสองวัน จะให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดสูงกว่ากรีดวันเว้นวัน 12 - 23% ส่วนการกรีดถี่ โดยกรีดทุกวันกรีดสองวันเว้นวัน กรีดสามวันเว้นวัน กรีด 4 - 7 วันเว้นวัน ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง เพราะต้นยางสูญเสียน้ำยางมาก ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแห้งเพิ่มมากขึ้น</p> <p>4.3 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับพันธุ์ยางกลุ่มที่มีการตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางน้อย ได้แก่ BPM 24, PB 235, สถาบันวิจัยยาง 251 และไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอก่อต่อการเกิดอาการเปลี่ยนแห้งได้ง่าย เช่น BPM 24, PB 235, PB 255, PB 260</p> <p>4.4 ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางในช่วงแล้ง ขณะต้นยางเริ่มผลัดใบ และผลใบใหม่เนื่องจากสารเคมีเร่งน้ำยางยึดเวลาการให้ของน้ำยาง และได้ผลผลิตมากขึ้นต้นยางมีการสูญเสียน้ำจากลำต้น</p> <p>4.5 ช่วงอากาศหนาวน้ำยางจะไหวนานกว่าปกติ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง</p> <p>4.6 ความถี่ในการใช้ ในทางปฏิบัติควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2.5% ไม่กิน 6 ครั้งต่อปี (3 - 6 ครั้ง) การใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน จะให้ผลตอบแทนสูงในระยะ 3 - 4 ปีแรก หลังจากนั้นต้นยางจะตอบสนองต่อสารเคมีเร่งน้ำยางลดลง ที่มา : อารมณ์ ใจดี ศุภชัย ศุภชัยยางสราษฎร์ธานี</p>
4. กาแฟ	หนอนกาแฟสีแดง	<p>1. ทำความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิ่งและลำต้นกาแฟอยู่เสมอ</p> <p>2. หากพบการเข้าทำลายของหนอนเจ้ากิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง ให้ตัดกิ่งและลำต้นออกไปเผาทำลาย nokpalang</p> <p>3. ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงฟenantrothion (fenitrothion) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และนำไปทาด้วยแปรงทาสีบริเวณลำต้นกาแฟให้ทั่ว หากใช้ฉีดพ่นให้ใช้ในอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร</p>

๕.การคาดการณ์ศัตรูไม้เย็นตัน ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ภาคเหนือ

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม ด้วงแรด และหนอนกินใบ
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ โรคทะลายเน่า และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรค rak ขาว โรคใบร่วง โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และอาการเปลือกแห้ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง ด้วงกุหลาบ และโรคทะลายเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรคราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา และอาการเปลือกแห้ง

ภาคกลาง และภาคตะวันตก

- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนหน้าเมوا ด้วงกุหลาบ และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วง โรคราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา และอาการเปลือกแห้ง

ภาคตะวันออก


- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนหน้าเมوا และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง โรคราแป้ง และโรคใบจุดก้างปลา

ภาคใต้


- มะพร้าว ระวัง หนอนหัวดำ แมลงดำหานาม และด้วงแรด
- ปาล์มน้ำมัน ระวัง หนอนพาราชา โรคทะลายเน่า และโรคลำต้นเน่า
- ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง โรคราแป้ง และอาการเปลือกแห้ง
- กากแฟ ระวัง มอดเจาะเมล็ดกาแฟ เพลี้ยหอย โรคแอนแทรคโนส และโรคใบจุด

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของคัตสูมีนีนตัน ปี ๒๕๖๗


ภาพรวมทั่วประเทศ




กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗




ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗


กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูป่าล้มไม้ มัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗



ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗


กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของคัตตุรยางพารา ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗




ปี ๒๕๖๒




ปี ๒๕๖๓




ปี ๒๕๖๔



ปี ๒๕๖๕




ปี ๒๕๖๖




ปี ๒๕๖๗

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดของศัตรูภัยแพ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗



ปี ๒๕๖๖



ปี ๒๕๖๗