

# ปฏิทินการขจัดกาชศัตรูกล้วยน้ำว้า พันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรี ขั้วหวัดสุพรรณบุรี

กล้วย กล้วยน้ำว้า (กล้วย)


การป้องกันกำจัด

1. ใช้ยาฆ่าเชื้อราตามใบกล้วยตามปกติ
2. ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอัตรา ๒๕-๓๐ ๑๐๐ ๗
3. ใช้ยาฆ่าแมลงในกล้วยน้ำว้า ๓-๕ ครั้งต่อปีตามอายุกล้วย


โรคใบจุด

การป้องกันกำจัด

- ใช้ยาฆ่าเชื้อรา 10g / 20L น้ำ
- ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอัตรา ๒๕-๓๐ ๑๐๐ ๗
- ใช้ยาฆ่าแมลง ๓-๕ ครั้งต่อปี



อายุ ๒ ปี  
พบกาชกล้วย



อายุ 4-5 ปี  
พบกาชกล้วย



อายุ 6-8 ปี  
พบกาชกล้วย



อายุ 10-12 ปี  
พบกาชกล้วย

โรคตาบอดกล้วย

การป้องกันกำจัด

1. ใช้ยาฆ่าเชื้อราตามใบกล้วย (Tissue Culture)
2. ทำลายต้นกล้วยที่เป็นโรค
3. ตัดกล้วยที่ตายแล้วทิ้ง
4. ใช้ยาฆ่าแมลงตามใบกล้วย
5. ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอัตรา ๒๕-๓๐ ๑๐๐ ๗
6. ใช้ยาฆ่าแมลงตามใบกล้วย ๓-๕ ครั้งต่อปี
7. ใช้ยาฆ่าแมลงตามใบกล้วย ๓-๕ ครั้งต่อปี

โรคเน่าเน่า

- เกิดจากลมแรง (stock weevil)

การป้องกันกำจัด

1. ใช้ยาฆ่าแมลงตามใบกล้วย
2. ตัดกล้วยที่ตายแล้วทิ้ง
3. ใช้ยาฆ่าแมลงตามใบกล้วย ๓-๕ ครั้งต่อปี

ภาพโดย: วาสนา ใจกล้า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

## ปฏิทินการจัดการศัตรูกล้วยตามระยะการเจริญเติบโต

	ปลูก-กล้า (เดือนที่ 1-2 )	แตกกอ (เดือนที่ 3-5)	ออกปลี (เดือนที่ 6-9)	เจริญเติบโตทางผล-ผลแก่ (เดือนที่ 10-12)
โรคพืช	ใบจุด ยอดม้วน	ตายพราย เหี่ยว ใบจุด ยอดม้วน	เหี่ยว ใบจุด	ใบจุด
แมลงศัตรูพืช	ด้วงวงไขเหง้า หนอนม้วนใบ ด้กแตนผี	ด้วงวงไขเหง้า หนอนม้วนใบ ด้กแตนผี หนอนกระทู้ หนอนร่าน	หนอนม้วนใบ หนอนกอ ด้วงวงไขเหง้า ด้วงวงเจาะลำต้น	ด้วงวงไขเหง้า ด้วงวงเจาะลำต้น หนอนม้วนใบ แมลงวันผลไม้ เพลี้ยแป้ง
ศัตรูพืชอื่นๆ	วัชพืช			
	สำรวจและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ จำนวน 10 ต้น กระจายทั่วแปลง โดยสำรวจการเกิดโรค การถูกแมลงเข้าทำลายของแต่ละต้น และสำรวจแมลงวันผลไม้ โดยใช้กับดัก 1 กับดักต่อ 1 แปลง			

### การจัดการ

1. ใช้หน่อปลอดโรคหรือจากแหล่งที่ไม่มีโรคระบาด
2. ระวังไม่ให้เกิดแผลกับหน่อกล้วย
3. หน่อกล้วยที่ตัดแต่งก่อนปลูกควรแช่ด้วยสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
4. ตัดใบกล้วยที่เป็นโรคใบจุดนำไปเผาทิ้ง
5. ขุดหน่อกล้วยที่เป็นโรคยอดม้วนออกไปทำลาย และควบคุมแมลงพาหะ เช่น เพลี้ยต่าง ๆ
6. ทำความสะอาดสวนไม่ให้เกิดโรค
7. ดัก จับ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช
8. ฉีดพ่นเชื้อราบีวาเวอเรียและน้ำส้มควันไม้หรือใช้น้ำสกัดสมุนไพรราดบริเวณโคนต้นเป็นประจำใช้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช
9. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำ

1. รองกันหลุมปลูกด้วยเชิ้อราไตรโคเดอร์มา
2. ไม่ทำให้พื้นที่ปลูกมีน้ำขังหรือแฉะ
3. ตัดส่วนที่เป็นโรคหรือขุดต้นเป็นโรค ออกไปเผา และโรยปูนขาวลงในหลุมที่ขุดต้นออก 1-2 กก.
4. ใส่ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุฟอสเฟตและโปแตสเซียมสูง และไม่ควรรีใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนมาก
5. ทำความสะอาดสวนไม่ให้เกิดโรค
6. ดัก จับ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช
7. ฉีดพ่นเชื้อราบีวาเวอเรีย และน้ำส้มควันไม้หรือใช้น้ำสกัดสมุนไพรราดบริเวณโคนต้นเป็นประจำใช้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช
8. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำ

1. ตัดส่วนที่เป็นโรคหรือขุดต้นเป็นโรคออกไปทำลายโดยการเผา และโรยด้วยปูนขาวในหลุมที่ขุดออก 1-2 กก.
2. ทำความสะอาดสวนไม่ให้เกิดโรค
3. ดัก จับ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช
4. ฉีดพ่นเชื้อราบีวาเวอเรีย และน้ำส้มควันไม้หรือใช้น้ำสกัดสมุนไพรราดบริเวณโคนต้นเป็นประจำใช้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช
5. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำ

1. ตัดใบกล้วยที่เป็นโรคใบจุดนำไปเผาทิ้ง
2. ใช้เหยื่อพิษควบคุมแมลงวันผลไม้
3. ทำความสะอาดต้นกล้วยโดยการตัดใบแห้งออก
4. ฉีดพ่นเชื้อราบีวาเวอเรีย และน้ำส้มควันไม้หรือใช้น้ำสกัดสมุนไพรราดบริเวณโคนต้นเป็นประจำใช้เพื่อไล่แมลงศัตรูพืช
5. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำ

