



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร


ปีที่ 13 ฉบับที่ 34 วันที่ 26 สิงหาคม 2569

โรคเน่าคอดิน

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด (เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักกวางตุ้ง คะน้า เป็นต้น) ในระยะกล้า เผื่อระวังการระบาดของโรคเน่าคอดิน เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในฤดูฝนฝนตกติดต่อกัน ความชื้นในอากาศสูง สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรค ดังนั้น ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นกล้าแสดงอาการของโรค ให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา *Pythium* spp.

ลักษณะอาการ : บริเวณโคนต้นที่ติดกับผิวดินมีลักษณะซ้ำฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้ม เมื่ออาการรุนแรงเนื้อเยื่อจะเกิดเป็นแผลเน่าลาม ทำให้ต้นกล้าเหี่ยวทั้งต้น หักล้ม และตายก่อนจะแตกใบจริง บางครั้งเชื้อราอาจเข้าทำลายเมล็ดก่อนงอกขึ้นดิน ทำให้เมล็ดไม่งอก หรืองอกออกมาแต่ไม่มีใบเลี้ยง



แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

1. ควรใช้วัสดุปลูกที่สะอาดจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค ในการเพาะกล้า
2. ควรไถแปลงพลิกกลับหน้าดินตากแดด เพื่อลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคในดินก่อนปลูก
3. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกำจัดเชื้อรา เมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนเพาะกล้า
4. เพาะเมล็ดในระดับที่ไม่ลึกมากและไม่แน่นจนเกินไป
5. ไม่ควรให้น้ำในแปลงเพาะกล้าขึ้นและเกินไป
6. เมื่อพบต้นที่เป็นโรค ให้ถอนและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที แล้วราดดินบริเวณที่เป็นโรค และบริเวณใกล้เคียงด้วยสารกำจัดเชื้อรา โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ดังนี้
 - โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ 72.2 % SL อัตรา 6 – 12 มิลลิลิตร
 - ไฮเมกซาโซล 36 % SL อัตรา 22 – 26 มิลลิลิตร

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

ที่ปรึกษา : นางสาวสุนนา สิมาสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงและบรรณาธิการ : นางสาวกันยากร อุทัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

